

# I RAGNI


DI

# CALABRIA

## STUDIO

Del Sac. Prof. ENRICO CAFFI


DOTTORE IN SCIENZE NATURALI



BERGAMO

Tipografia S. Alessandro

1895



## INTRODUZIONE

Già da parecchi anni è stato pubblicato un catalogo generale dei regni d'Italia <sup>(1)</sup> e tuttavia era necessario lo studio delle varie regioni della nostra penisola e delle isole, per riconoscere la esistenza di altre specie, che si potevano supporre esistenti, per meglio determinare l'area di diffusione di ogni specie e per conoscere più dettagliatamente quali forme abitino una regione o l'altra d'Italia, quali specie caratterizzino i vari nostri climi.

Per riguardo alla Calabria si può dire che tutto era ancora da farsi, poichè fino ad oggi non ci sono note che 37 specie di regni.

I primi accenni a regni, abitanti in Calabria, si hanno in **E. pisanio Ferdinando**, il quale accenna alla presenza delle tarantole con queste parole: « *Apud Rhegium Calabriae acceptimus a fide dignis elici sericem ex ipsis araneis* » <sup>(2)</sup>.

**Vincenzo Petagna** descrive una **ARANEA NIGRA** la quale *invenitur in plenis saltibus Rheginorum, vulgo Asprononta* <sup>(3)</sup>. Questa **ARANEA NIGRA**, corrispondente all'**ERESTUS ATER**, Wlk. 1805, e al **CHEERSIS DUBRUS**, Wlk. 1837, probabilmente non è che l'**ERESTUS CINNABARINUS**, Oliv. 1780.

(1) **Concistrini G.** e **Pavesi P.** — Araneidi italiani in Atti Soc. It. Sc. Nat. XI, 2, Milano 1868. — **Id. Id.** — Catalogo sistematico degli Araneidi italiani in Arch. zool. nat. ital., s. II, v. II, p. 11, Bologna 1870.

(2) **Epif. Ferdinando** — *Cantone Historiae seu observationes ad caetera metra*. — Hist. 81, pag. 201, Venezia 1691.

(3) **Petagna V.** — *Specimen insectorum Ultroris Calabriae*. Neapoli 1786.

In questo ultimo ventennio lo studio di quella regione fu cominciato dal Dott. **Cuelfo Cavanna**, il quale in una sua pubblicazione (1) dà un elenco di 28 specie di ragni, delle quali parecchie non furono da me riscontrate.

Nei mesi di Luglio e Agosto 1880 lo stesso Dott. G. Cavanna raccoglieva nuovo materiale per lo studio aracnologico in varie località dell'Italia centrale e meridionale, il quale servì per una memoria del sig. **E. Simon** (?). Ma fra le 73 specie di ragni elencate dall'aracnologo francese, soltanto 8 interessano il nostro studio, perchè raccolte sul Monte Pollino o a Mornano.

Il Dott. G. Cavanna, in una sua escursione nel Maggio e Giugno 1877, fece una copiosa raccolta di aracnidi della Calabria, che furono spediti al Museo Zoologico della R. Università di Pavia per la determinazione delle specie. In seguito mandò allo stesso Museo un'altra raccolta da lui fatta anteriormente, cioè nel 1873, insieme ad un discreto numero di esemplari raccolti a Catanzaro dal Cap. **Adami**, non si sa in qual anno, e che si trovavano indeterminati al Museo di Firenze.

Il Dott. **Elvezio Cantoni**, studiosi i *Chernetidi* e gli *Ophionidi*, cominciò l'esame dei ragni, presto interrotto per trasferimento in altre sedi. Il più restava ancora da farsi, per cui io, seguendo il consiglio dell'egregio mio maestro, prof. **Pietro Pavese**, mi posi a questo studio.

Per la parte sistematica io ho seguito in generale la classificazione proposta dal sig. E. Simon nella sua opera: « *Les arachnides de France*. » Paris 1874-1884.

Attinchè poi il catalogo riuscisse completo, ho aggiunto le specie elencate da Cavanna e da Simon, e che da me non furono riscontrate, distinguendole con un asterisco.

Io mi lusingo di aver condotto a termine questo studio con tale cura, da soddisfare il desiderio e l'aspettazione dei collezionatori. A loro, quanto al prof. Pietro Pavese, sono dovuti i miei vivi ringraziamenti.

(1) **Cavanna G.** — *Studi e ricerche di aracnologia* (Ann. Soc. Entom. It. VIII), Firenze 1876.

(2) **Simon E.** — *Aracnidi raccolti al Vulture etc.* (Ann. Soc. Entom. It. XIV), Torino 1882.

## CENNI BIBLIOGRAFICI

I professori G. Canestrini e P. Pavese, pubblicando il loro primo lavoro di « *Aracnidi italiani*, » manifestavano un loro desiderio con queste parole :

*Il nostro lavoro è un voto di vedermne sorgere altri (cataloghi) specialis per ciascuna delle svariate regioni italiane, voto che, essendo largamente le assidue ricerche.*

In verità, se consideriamo gli studi fatti nella seconda metà di questo secolo, dobbiamo riconoscere che, sebbene ancora non ci sia dato di compilare un catalogo abbastanza completo di tutta Italia, tuttavia in varie regioni e provincie si è lavorato alla conoscenza delle varie famiglie, per riguardo ai ragni. Da italiani e da stranieri parecchie pubblicazioni furono fatte, riguardanti questa o quella regione d'Italia.

Io ho cercato di conoscere tutte le pubblicazioni state fatte allo scopo di far conoscere l'aracnofauna italiana e le ho qui riunite.

### ITALIA.

**Canestrini G.** e **Pavese P.** - *Aracnidi italiani* (Atti Soc. It. Sc. Nat. XI, 3), Milano 1868.

**Id. Id.** - *Catalogo sistematico degli Aracnidi italiani* (Arch. zool. anat. fisiol. s. II, v. II), Bologna 1870.

### PIEMONTE.

**Pavese P.** - *Note aracnologiche* (Atti Soc. It. Sc. Nat. XVIII), Milano 1875.

**De-Carlini A.** - *Ateropodi di Val Tigezzo* (Bull. Soc. Entom. It. XXIV), Firenze 1892.

CANTON TICINO.

**Pavesi P.** - *Ragni del Canton Ticino* (Ann. Mus. civ. IV), Genova 1873.

**Id.** - *Note araneologiche* come sopra.

LOMBARDIA.

**Maironi da Ponte** - *I tre ragni della natura nella provincia bergamasca*, Modena 1830.

**Sordelli F.** - *Sui ragni lombardi* (Atti Soc. It. Sc. Nat. XI), Milano 1868.

**Pavesi P.** - *Aracnidi* (Notizie natur. chim. agronom. prov. di Pavia), Pavia 1864.

**Id.** - *Ragni dei dintorni di Pavia* (Atti Soc. It. Sc. Nat. XVI, 1), Milano 1873.

**Id.** - *Note araneologiche*, come sopra.

**Id.** - *Fauna araneologica del Taresotto* (Atti Soc. It. Sc. Nat. XXI), Milano 1878.

**Marza F.** - *Note faunistiche sulla Val Staffora* (Atti Soc. It. Sc. Nat. XXIV), Milano 1888.

**De-Carlini A.** - *Ateropodi di Valtellina* (Bull. Soc. Entom. It. XXI), Firenze 1880.

**Anonimo** - *Cremona e la sua provincia*, Cremona 1863.

TRENTINO.

**Canestrini G.** - *Aracnidi osservati nel Veneto e nel Trentino* (Comm. Fior., fauna, gen Ven. Trent. I, n. 2), Venezia 1867.

**Id.** - *Nuovi aracnidi italiani* (Atti Soc. Nat. XI, 3), Modena 1868.

**Id.** - *Aracnidi del Veneto e del Trentino* (Comm. come sopra), Venezia 1869.

**Id.** - *Fauna del Trentino* (Atti Soc. Ven. Tr. Sc. Nat. IV, 1), Padova 1875.

**Moschen L.** - *Aggiunte alla fauna araneologica del Trentino* (Atti Soc. Ven. Tr. Sc. Nat. VI, 1), Padova 1879.

VENETO.

**Contarini N.** - *Catologo degli insetti delle provincie di Padova e Venezia*, Bassano 1843.

**Id.** - *Elenco aracnidi* (Venezia e sue lagune), Venezia 1847.

**Disconzi** - *Entomologia vicentina*, Padova 1865.

**Canestrini G.** - V. sopra le memorie del 1867 e 1869.

**Id.** - *Aracnidi osservati nel Veneto* (Comm. Fior., fauna, gen Ven. Tr. I, n. 4), Venezia 1868.

**Ninni A. P.** - *Catologo di aracnidi trevigiani*, Venezia 1869.

**Id.** - *Indice alfabetico, sinonimico e sistematico degli aracnidi veneti*, Venezia 1870.

NIZZARDO.

**Risso A.** - *Histoire naturelle*, V. Paris 1826.

LIGURIA.

Ch. Pavesi P. - *Ragni del Canton Ticino*.

TOSCANA.

**Hessi P.** - *Fauna etrusca*, Livorni 1790.

**Hackwail J.** - *List of spiders of the province of Lucca* (Journ. Linn. Soc. X).

**Palau C.** - *Catologo di aracnidi dei dintorni di Foggia*, Livorno 1878.

**Simon E.** - *Aracnidi raccolti a Livorno* (Bull. Soc. Entom. It. XIV), Firenze 1882.

ROMA.

**Eucens E.** - *On spiders captured at Rome* (Ann. Soc. Entom. Fr. IV, 9), Paris 1869.

**Pavesi P.** - *Aracnidi dell'Agro Romano* (Ann. Mus. Civ. XII), Genova 1878.

CAMPANIA.

**Dominici Cirilli** - *Entomologie Neapolitanae specimen*, Neapoli 1787.

**Petagna V.** - *Institutiones entomologicae*, Neapoli 1792.

**Costa O. G.** - *Fauna del regno di Napoli*. Napoli 1836.

**Id.** - *Fauna Vesuviana* (Atti R. Acc. Sc.), Napoli 1839.

BASILICATA.

**Simon E.** - *Aracnidi raccolti al Volturne ecc.* (Bull. Soc. Entom. It. XIV), Firenze 1882.

PUGLIA.

**Cantoni E.** - *Aracnidi di Puglia* (Boll. scient. I), Pavia 1882.

SICILIA.

**Blackwall J.** - *List of Sicilian spiders* (Ann. a. Mag. Nat. Hist. s. IV, v. V, n. XXX), Dublin 1870.

**Wright E. P.** - *Notes on a collection of spiders made in Sicily* (Ibid.), Dublin 1870.

**Cantoni E.** - *Aracnidi della Madonie* (Bull. Soc. Entom. It. III, IV), Firenze 1881.

SARDEGNA.

**Margretti P.** - *Escursione zoologica in Sardegna* (Ann. Soc. It. Sc. Nat. XXIII), Milano 1880.

**Costa A.** - *Note e osservazioni sulla geofauna Sarda*. Napoli 1882-1884.

CORSICA.

**Simon E.** - *Aracnides de Francee*. Paris 1874-1884.

Isole GORGONA, CAPRAIA, TOPI, ELBA, GIGLIO, PIANOSA, GIANNUTRI, MONTECRISTO, CAPRERA, SERPENTARA, VAACA, PANTELLERIA.

**Pavese P.** - *Le prime crociere del Violante* (Ann. Museo civ. VIII), Genova 1876.

Isole LINOSA, LAMPEDUSA.

**Pavese P.** - *Nuovi risultati aracnologici delle crociere del Violante* (Ann. Mus. civ. XI), Genova 1878.

Isla CAPRI.

**Pavese P.** - *Note aracnologiche* (Atti Soc. It. Sc. Nat. XVIII), Milano 1875.

Isla ISCHIA.

**Simon E.** - *Aracnides de l'isle d'Ischia* (Ann. Soc. Entom. Fr. s. V, I, III), Paris 1877.

Isla S. PIETRO.

**De-Carlini A.** - *Artrropodi dell' Isola di S. Pietro* (Bull. Soc. Entom. It. XVII), Firenze 1885.

Isla USTICA.

**Boeris G.** - *Di alcuni regni di Ustica* (Natural. Sicil., VIII), Palermo 1889.

Anche in altre pubblicazioni si trovano notati regni abitanti in Italia, ma per non dilungarmi troppo nella parte bibliografica, le ho ommesse, non trattando direttamente della fauna italiana.

Per quanto mi fu possibile, non ho trascurato alcuna pubblicazione, la quale mi potesse servire a stabilire la distribuzione nelle varie regioni d'Italia di quelle specie di regni che abitano la Calabria.

CI. ARACHNOIDEA

ORD. ARANEÆ

I.º Sottord. ARAN. OCULATÆ

I.ª FAM. ATTIDÆ.

I.º Gen. **Salicus** Latr.

1. **Salicus formicarius**, De-Geer 1778 (sub: *Aranea*)  
- (*De-Geer C. - Mem. p. servir à l'hist. d. insectes*, VIII, p. 293,  
tav. XVIII, fig. 1-5, Stockolm 1778).

*Habitat*: Comune in tutta Europa.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia,  
Trentino, Veneto, Emilia, Agro Romano, Sicilia, Corsica.

*Località caldre*: Dintorni di Palizzi.

II.º Gen. **Lepiorchestes** Thor.

2. **Lepiorchestes chrysopogon**, Sim. 1876 (*Simon E.*  
- *Arachnides de France*, III, p. 11, Paris 1874-1884).

*Habitat*: Corsica, Dalmazia.

*Distribuzione in Italia*: Corsica.

*Località caldre*: Raderi di Rocca Angitola.

3. **Lepiochestes multiloides**, Linc. 1849 (*Lucas H.* -  
*Explor. scient. de l'Algérie*, I, p. 185, tav. X, fig. 7, Paris 1849).

*Habitat*: Ungheria. Regione mediterranea.  
*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Sicilia, Corsica.  
*Località calabre*: Orto De-Leo in Bagnara. Dintorni di Palizzi.

III.<sup>o</sup> Gen. **Marpissa** C. K.

4. **Marpissa muscosa**, Cl. 1757 (sub: *Aranens*) - (*Clarck*  
*C. - Svenska spindlar*, p. 116, pl. 5, tab. 12, Stockholm 1757).  
*Habitat*: Svezia, Inghilterra, Europa meda e meridionale.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia,  
 Trentino, Veneto, Emilia, Campania.  
*Località calabre*: Dintorni di Arena.

IV.<sup>o</sup> Gen. **Mememerus** Sim.

5. **Mememerus semitimbatus**, E. 1831 (sub: *Salticus*)  
 - (*Hahn W. - Monogr. d. spinnen*, V, tav. III, fig. B, Nürnberg  
 1829-1836).  
*Habitat*: Ungheria. Regione mediterranea.  
*Distribuzione in Italia*: Lombardia?, Trentino, Veneto, Emilia, E-  
 milia, Liguria, Agro Romano, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna,  
 Corsica, Capri, Ischia, Nisida, Lipari, S. Pietro, Pantelleria.  
*Località calabre*: Lungo la Via da Bagnara a Scilla, sotto  
 un arco del viadotto.

V.<sup>o</sup> Gen. **Pseudicius** Sim.

6. **Pseudicius butius**, Sim. 1868 (sub: *Marpissus*) -  
 (*Simon E. - Monogr. des Arctides* in Ann. Soc. Ent. Fr. s. IV,  
 tav. VIII, p. 27, Paris 1868).  
*Habitat*: Italia, Grecia.  
*Distribuzione in Italia*: Lombardia, Veneto, Sicilia, Corsica.  
*Località calabre*: Dintorni di Arena.

VI.<sup>o</sup> Gen. **Dendryphanes** C. K.

7. **Dendryphanes encarpatus**, Wlk. 1802 (sub: *Ara-  
 nea*) - (*Walckenaer C. - Faune Paris. Insectes*, II, p. 241, n. 3,  
 Paris 1802).

*Habitat*: Svezia. Europa medea e meridionale.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia,  
 Veneto, Emilia, Toscana, Corsica, Elba.  
*Località calabre*: Dintorni di Palizzi.

8. **Dendryphanes nictinus**, Sim. 1868 (sub: *Attus*)

- (*Simon E. - Monogr. des Arctides*, p. 33).  
*Habitat*: Regione mediterranea.  
*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia, Veneto,  
 Emilia, Corsica, Capri.  
*Località calabre*: Raderi di S.ta Venera.

9. **Dendryphanes picaceus**, Sim. 1868 (sub: *Attus*)

- (*Simon E. - Monogr. citata*, p. 573, tav. II, fig. 4).  
*Habitat*: Italia.  
*Distribuzione in Italia*: Sicilia.  
*Località calabre*: Dintorni di Pizzo.

VII.<sup>o</sup> Gen. **Philaeus** Thor.

10. **Philaeus chrysoptis**, Poda 1761 (sub: *Araña*) - (*Poda  
 N. - Ins. Mus. Graec.*, p. 129, Graecii 1761).  
*Habitat*: Norvegia. Europa medea. Regione mediterranea.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombar-  
 dia, Trentino, Veneto, Istria, Emilia, Nizza, Toscana, Puglia,  
 Sicilia, Corsica, Capri, Ischia.  
*Località calabre*: Catanzaro. Dintorni di Arena. Interno di  
 cusa diruta, sotto Nicotera. Gusino Rossi a Bagaludi. Poggio di  
 S. Lorenzo. Monte Covolo, presso Palizzi, in alto.

VIII.<sup>o</sup> Gen. **Thyene** Sim.

11. **Thyene imperialis**, W. Rossi 1847 (sub: *Salticus*) -  
 (*W. Rossi in Simon E. - Arach. de France*, III, p. 52, tav. XI,  
 fig. 16, Paris 1874-1884).  
*Habitat*: Regione mediterranea. Aden. Asia meridionale.  
 Filippine.  
*Distribuzione in Italia*: Puglia, Sicilia, Corsica.  
*Località calabre*: Raderi di Rocca Angitola. Orti di Milieto.  
 Dintorni di Palizzi.

IX.<sup>o</sup> Gen. **Calliethera** C. K.

12. **Calliethera scenica**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) -  
(*Clerck C. - Opera citata*, p. 117, pl. V, tab. 13).  
*Habitat*: Europa. Madera. Algeria. Sudan. Sambelong. Canada e Massachusetts?  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Nizza, Toscana, Puglia, Sardegna, Corsica, Capri.  
*Località calabre*: Pressi di Nicotera. Castagneto ceduo, sopra Palmi. Madonna degli Arebi, presso Reggio. Monte Garvare, reg. Nardello (Aspromonte).
13. **Calliethera zebhranca**, C. K. 1837 (*Koch C. L. - Arachniden system*, I, p. 31, Nürnberg 1837-1850).  
*Habitat*: Inghilterra. Germania. Francia. Grecia. Dalmazia.  
*Distribuzione in Italia*: Trentino, Veneto, Corsica.  
*Località calabre*: Monte Stella, presso Stilo. Casino Rossi a Bagnardi.

X.<sup>o</sup> Gen. **Hasarius** Sim.

14. **Hasarius falcatus**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - *Clerck C. - Opera citata*, p. 125, pl. V, tab. 19).  
*Habitat*: Europa.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Liguria, Puglia, Sardegna.  
*Località calabre*: Pressi di Mileto, di Nicotera, di Palizzi. Oliveti presso Palmi. Orto De-Leo in Bagnara. Monte Consolino, presso Stilo.

XI.<sup>o</sup> Gen. **Ergane** Sim.

15. **Ergane jucunda**, Luc. 1842 (sub: *Salticus*) - (*Lucas H. - Opera citata*, p. 146, tav. VI, fig. 8).  
*Habitat*: Regione mediterranea.  
*Distribuzione in Italia*: Liguria, Toscana, Agro Romano, Valture, Sicilia, Sardegna, Corsica, Corgona, Giannutri, Capri, Ischia, Ustica.  
*Località calabre*: Dintorni di Arena.

XII.<sup>o</sup> Gen. **Attus** Sim.

- 16.\* **Attus adricapillus**, Sim. 1882 (*Simon E. - Aracnidi raccolti al Valture ecc. in Bull. Soc. Ent. It. XIV*, p. 17, Firenze 1882).  
*Habitat*:  
*Distribuzione in Italia*:  
*Località calabre*: } Monte Pollino.

XIII.<sup>o</sup> Gen. **Phegra** Sim.

17. **Phegra bresaniensis**, Luc. 1842 (sub: *Salticus*) - (*Lucas H. - Opera citata*, p. 154, tav. VII, fig. 5).  
*Habitat*: Europa centrale. Regione mediterranea.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Toscana, Agro Romano, Campania, Sicilia, Sardegna, Corsica, Capri, Ischia.  
*Località calabre*: Dintorni di Arena.

XIV.<sup>o</sup> Gen. **Aelurillus** Sim.

18. **Aelurillus monardi**, Luc. 1842 (sub: *Salticus*) - (*Lucas H. - Opera citata*, I, p. 156, pl. VII, fig. 2 e 5).  
*Habitat*: Regione mediterranea.  
*Distribuzione in Italia*: Sicilia, Ustica.  
*Località calabre*: Colle sopra Pizzo.

XV.<sup>o</sup> Gen. **Meliophanus** C. K.

19. **Meliophanus cenusus**, H. 1831 (sub: *Salticus*) - (*Hahn W. - Die Arachniden*, I, p. 65, fig. 49, Nürnberg 1831-1834).  
*Habitat*: Europa.  
*Distribuzione in Italia*: Lombardia, Canton Ticino, Puglia, Sicilia.  
*Località calabre*: Dintorni di Arena. Rovine di S.ta Venera. Casino Rossi sul Monte Poro e a Bagnardi. Dintorni di Palizzi.
20. **Meliophanus cambridgעי**, Sim. 1868 (*Simon E. - Monogr. citata*, p. 695).  
*Habitat*: Inghilterra. Europa. media e meridionale.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia, Campania, Ischia.

*Località calabre*: Sillo. Poggio di S. Lorenzo. Dintorni di Palizzi.

21. **Meliophanus cupreus**, Wlk. 1802 (sub: *Arenae*) - (*Walcenauer C. - Faun. Paris* citata, II, p. 245).

*Habitat*: Europa. Siberia Orientale. Algeria.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Agro Romano, Sardegna, Corsica.

*Località calabre*: Camposanto dei colerosi a Bagnara. Poggio di S. Lorenzo. Dintorni di Palizzi.

22. **Meliophanus flavipes**, H. 1831 (sub: *Sablicus*) - (*Hahn W. - Die Arach. citata*, I, p. 66, fig. 50).

*Habitat*: Europa. Turkestan.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Agro Romano, Vulture, Sicilia, Corsica, Capri, Usicra.

*Località calabre*: Colle di Pizzo. Rovine di S.ta Veneta. Orti di Mileto. Arena. Monte Poro. Nicotera. Oliveti presso Palmi. Monte Cavaliere (Aspromonte). Bagaladi. Palizzi.

23. **Meliophanus Koehli**, Sim. 1868 (*Simon E. - Monogr. citata*, p. 699, tav. III, fig. 13).

*Habitat*: Francia. Tirolo. Albania.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino.

*Località calabre*: Colle di Pizzo. Marina di Biyona. Monte Poro. Arena. Orti di Mileto. Casino Rossi a Bagaladi. Dintorni di Palizzi.

24. **Meliophanus melinus**, L. K. 1867 (*Koch L. - Z. Archiv. u. Myriap. fauna Sud-Europas* in Verh. d. zool. bot. Gesellsch, XVIII, p. 870, Wien 1867).

*Habitat*: Dalmazia. Albania. Grecia. Siria.

*Distribuzione in Italia*: Puglia.

*Località calabre*: Stazione di Monasterace. Dintorni di Palizzi.

#### XVI.<sup>o</sup> Gen. **Euophrys C. K.**

25. **Euophrys erratica**, Wlk. 1825 (*Walcenauer C. - Faun. de France* in Faune France, p. 46, Paris 1825).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia, Veneto, Emilia, Corsica.

*Località calabre*: Dintorni di Arena. Mileto. Orto De-Bella in Nicotera. Monte Consolino a Sillo. Orti di Palmi. Imboccatura della grotta della Melia presso Scilla.

26. **Euophrys finitima**, Sim. 1868 (sub: *Attus*) - (*Simon E. - Monogr. citata*, p. 591).

*Habitat*: Europa meridionale. Siria.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Romagna, Agro Romano, Sicilia, Corsica, Capri.

*Località calabre*: Pandici erbose del Colle di Pizzo.

27. **Euophrys frontalis**, Wlk. 1802 (sub: *Arenae*) - (*Walcenauer C. - Faun. Par. citata*, II, p. 246).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Agro Romano, Capri.

*Località calabre*: Castagneto ceduo sopra Palmi. Interno del castello di Scilla. Colle rimpetto al castello di Palizzi.

28. **Euophrys turbarbis**, Sim. 1868 (sub: *Attus*) - (*Simon E. - Monogr. citata*, p. 602, tav. II, fig. 8).

*Habitat*: Francia. Tirolo. Dalmazia.

*Distribuzione in Italia*: Toscana, Ischia, Vacca. *Località calabre*: Dintorni di Arena. Orto Versace in Bagnara.

#### II.<sup>a</sup> FAM. LYCOSIDAE.

I.<sup>o</sup> Gen. **Ocyale** Aud. in Sav.

29. **Ocyale mirabilis**, Cl. 1757 (sub: *Arenaeus*) - (*Clerck Opera citata*, p. 108, pl. 5, tab. 10).

*Habitat*: Europa. Is. Azzorre. Algeria. Tunisia. Madera. Nuova Zelanda. Turkestan.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombur-

dia, Trentino, Veneto, Emilia, Nizza, Toscana, Agro Romano, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna, Corsica, Ischia, Montecristo.

*Località calabre*: Spiaggia dell' Angitola. Colle di Pizzo. Molino Scotolo, sotto Monteleone. Ruderì di Rocca Angitola e di S.ta Venera. Piana di Ravello. Monte Porò. Arena. Nicotera. Colle Pettarello. Poggio di S. Lorenzo. Oliveti presso Palmi. Palizzi.

#### II.º Gen. **Lycosa** Latr.

30. **Lycosa accentuata**, Latr. 1816 (*Latreille P. A.* - *Aragones* in Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XVIII, p. 294, Paris 1816).

*Habitat*: Europa. Stati Uniti?  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Agro Romano, Campania, Sicilia.  
*Località calabre*: Monte Murello, presso Pizzo. Monte Pietra Cappella, reg. Nardello (Aspromonte).

31. **Lycosa albofasciata**, Br. 1832 (*Brullé A.* - *Insectes de Morée* in Exped. scientif. de Morée, II, p. 54, tav. XXVIII, fig. 7, Paris 1832).

*Habitat*: Regione mediterranea.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Istria, Agro Romano, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna, Corsica, Capri, Ischia.

*Località calabre*: Collina sopra Pizzo. Monte Murello. Rovine S.ta Venera. Filandari. Mileto. Arena. Oliveti presso Palmi. Casino De-Leo sopra Bagnara. Piani della Melia presso Scilla.

32. **Lycosa cinerea**, Fabr. 1793 (sub: *Aranea*) - (*Fabricius J. G.* - *Entom. system.*, p. 423, Hafniae 1793).

*Habitat*: Europa.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Lombardia, Puglia, Sicilia, Sardegna.

*Località calabre*: Rovine di S.ta Venera. Piana di Ravello. Sul letto asciutto del torrente Mammella, presso Mileto. Nicotera. Monte Covolo, presso Palizzi, in alto.

33. **Lycosa fabrilis**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerck Opera citata*, p. 86 pl. IV, tab. 2).

*Habitat*: Svezia. Europa media e meridionale.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Lombardia, Trentino, Emilia.

*Località calabre*: Monte Cavaliere (Aspromonte).

34. **Lycosa nemoralis**, Westr. 1862 (*Westring N.* - *Aranæ Suecicæ*, p. 472, Gothoburgi 1862).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia.

*Località calabre*: Dintorni di Arena. Monte Cavaliere (Aspromonte).

35. **Lycosa peria**, Latr. 1798 (*Latreille P. A.* - *Aragones minuses* in Bull. Soc. Philom., I, n. 22, p. 170).

*Habitat*: Svezia. Inghilterra. Europa centrale e meridionale. Africa settentrionale.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Nizza, Agro Romano, Campania, Puglia, Sardegna.

*Località calabre*: Nel letto asciutto del torrente Mammella presso Mileto. Bagnara: Casino De-Leo e presso il cimitero nuovo. Nella valletta e all'imboccatura della grotta della Melia presso Scilla. Palizzi.

36. **Lycosa radiata**, Latr. 1817 (*Latreille P. A.* - *Aragones* in Nouv. Dict. d'hist. nat., XVIII, p. 292, Paris 1817).

*Habitat*: Russia meridionale, Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna, Corsica, Pianosa, Montecristo, Capri, Vacca, Caprera, S. Pietro, Ustica.

*Località calabre*: Catanzaro. Monte Murello. Spiaggia dell' Angitola. Colle di Pizzo. Rovine di S.ta Venera. Sul letto asciutto del torrente Mammella, presso Mileto. Arena. Foreste della Mongiana. Piano della Melia, presso Scilla. Bagladi: Casino Rossi e piani di Solanu. Palizzi: Dintorni e sul Monte Covolo, in alto.

37. **Lycosa ruficola**, De-Geer 1778 (sub: *Aranea*) - (*De-Geer C.* - *Mem. p. servir à l'hist. d. insectes*, VIII, p. 281, tav. II, fig. 13 e 14; tav. XVII, fig. 1, 2, Stockholm 1778).

*Habitat*: Europa. Stati Uniti.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Sicilia, Corsica.  
*Località calabre*: Orti di Miletto. Orto De-Bella in Nicotera. Orto Versace in Bagnara. Imboccatura della grotta della Melia, presso Scilla. Palizzi.

38. **Lycosa tarantula**, Rossi 1790 (sub: *Aranea*) - (Rossi *P. - Fauna etrusca*, II, p. 132, Liburni 1790).  
*Habitat*: Italia, Dalmazia.  
*Distribuzione in Italia*: Val Staffora (Lombardia), Istria, Emilia, Romagna, Liguria, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia.  
*Località calabre*: Catanzaro.

39. **Lycosa terricola**, Thor. 1872 (*Thorell T. - Rem. ou. Synon. of Eur. spiders*, p. 339, Upsala 1870-1873).  
*Habitat*: Europa. Africa settentrionale. Turchestan.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Agro Romano, Campania, Basilicata, Sicilia, Ustica, Capri.  
*Località calabre*: Sulla spiaggia dell' Angitola. Arena. Casino De-Leo sopra Bagnara. Casino Rossi a Bagaladi. Palizzi.

### III.<sup>o</sup> Gen. **Pirata** Sund.

40. **Pirata hygrophilus**, Thor. 1872 (*Thorell T. - Rem. ou. Synon. cit.*, p. 343).  
*Habitat*: Svezia. Inghilterra. Francia. Prussia.  
*Distribuzione in Italia*: Ricontrato per la prima volta.  
*Località calabre*: Rudevi di S.ta Venera. Pressi di Nicotera. Orti di Scilla. Fiume Palizzi, presso il paese.

41. **Pirata leopardus**, Sund. 1832 (sub: *Lycosa*) - (*Sundevall - Svenska spidlarne beskrifning in Kongl. Vet. Acad. Handl.*, p. 189, Stockholm 1829-1832).  
*Habitat*: Svezia. Inghilterra. Francia. Svizzera. Austria.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Sicilia, Sardegna, Corsica, Pantelleria.  
*Località calabre*: Fontanella del Poro. Casino De-Leo, sopra Bagnara. Palizzi.

42. **Pirata piraticus**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerck - Opera citata*, p. 102, pl. V, tab. 4).

*Habitat*: Europa. Palestina.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Veneto. Corsica.  
*Località calabre*: Monte Pietra Cappella (Aspromonte).

### IV.<sup>o</sup> Gen. **Pardosa** C. K.

43. **Pardosa agricola**, Thor. 1856 (*Thorell - Rem. cit.*, p. 278).

*Habitat*: Europa.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Lombardia, Veneto.  
*Località calabre*: Valletta della grotta Melia. Monte Cavaliere (Aspromonte).

44. \* **Pardosa cursoria**, C. K. 1848 (*Koch. C. L. - Die Arachn.*, XV, p. 49, fig. 1450, Nürnberg 1836-1849).

*Habitat*: Europa media. Francia.  
*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia, Veneto, Emilia.  
*Località calabre*: Piano e varco del Pollino.

45. **Pardosa hortensis**, Thor. 1882 (*Thorell - Rem. cit.*, p. 299).

*Habitat*: Europa media e meridionale.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Sardegna?  
*Località calabre*: Monte Pecoraro. Monte Pietra Cappella (Aspromonte).

46. **Pardosa inquilina**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerck - Opera citata*, p. 88, pl. V, tab. 2).

*Habitat*: Europa settentrionale. Belgio. Francia.  
*Distribuzione in Italia*: Lombardia, Trentino.  
*Località calabre*: Dintorni di Arena.

47. **Pardosa lugubris**, Wlk. 1802 (sub: *Aranea*) - (*Walckenaer - Faune Paris citata*, p. 239).

- Habitat*: Europa. Tripoli.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino.  
*Località calabre*: Presso il bosco Feo di Palmi. Foreste della Mongiana.
48. **Pardosa nigricraps**, Thor. 1856 (sub: *Lycosa*) - (*Thorell - Rem. cit.*, p. 283).  
*Habitat*: Europa.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana.  
*Località calabre*: Dintorni di Palizzi.
49. **Pardosa proxima**, C. K. 1848 (sub: *Lycosa*) - (*Koch C. L. - Die Arachn.*, XV, p. 53, fig. 1453-1454).  
*Habitat*: Regione mediterranea.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Nizza, Agro Romano, Campania, Sardegna, Corsica, Capraia.  
*Località calabre*: Colle sopra Pizzo. Casino Corso sul Monte Poro. Pianna di Ravello. Piani di Selanu.
50. **Pardosa pullata**, Cl. 1757 (sub: *Aranus*) - (*Clerck - Opera citata*, p. 104, pl. V, tab. 7).  
*Habitat*: Europa.  
*Distribuzione in Italia*: Incerta.  
*Località calabre*: Monte Cavaliere (Aspromonte).
51. **Pardosa torrentium**, Sim. 1876 (*Simon - Arach. de Fr.* cit., III, p. 313, tav. XIII, fig. 26).  
*Habitat*: Francia.  
*Distribuzione in Italia*: Ricontrato per la prima volta.  
*Località calabre*: Un maschio presso Scilla.
- III.<sup>a</sup> FAM. OXYOPIDÆ.  
 Gen. **Oxyopes** Latr.
52. **Oxyopes heterophthalmus**, Latr. 1804 (sub: *Aranus*) - (*Latreille P. A. - Tableau method. des insectes in Nouv. Dict. d'hist. nat.*, VII, p. 280, Paris 1804).

- Habitat*: Regione mediterranea.  
*Distribuzione in Italia*: Lombardia, Puglia, Corsica.  
*Località calabre*: Arena. Monte Poro. Monte Stella, presso Stilo. Stazione di Monasterace. Lungo la via consolare presso Mileto. Colle Pettarello, presso Nicotera. Oliveti presso Palmi. Pizzo S. Lorenzo. Sotto Roccaforte.
53. **Oxyopes lineatus**, Latr. 1806 (*Latreille P. A. - Gen. crusb. et insect.*, I, p. 258, Paris 1806).  
*Habitat*: Lapponia. Russia meridionale. Regione mediterr.  
*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia, Isria, Toscana, Vulture, Puglia, Sicilia, Sardegna, Corsica, Capraia.  
*Località calabre*: Colle di Pizzo. Pianna di Ravello. Arena. Foreste della Mongiana. Monte Stella. Stilo. Monte Pecoraro. Stazione di Monasterace. Cumposanto dei colerosi di Bagnara. Casino Rossi a Bagaladi. Monte Covolo. Dintorni di Palizzi. Monte Cavaliere (Aspromonte).
- II.<sup>o</sup> Sottord. ARAN. VERÆ  
 IV.<sup>a</sup> FAM. HETEROPODIDÆ.  
 I.<sup>o</sup> Gen. **Micrommata** Latr.
54. **Micrommata ligurina**, C. K. 1845 (sub: *Sparrassus*) - (*Koch C. L. - Die Arach. cit.*, XII, p. 89, fig. 1020).  
*Habitat*: Regione mediterranea.  
*Distribuzione in Italia*: Sicilia, Sardegna, Corsica, S. Antioco.  
*Località calabre*: Colle di Pizzo. Mileto. Monte Poro. S.ta Eufemia. Palizzi.
55. **Micrommata virescens**, Cl. 1757 (sub: *Aranus*) - (*Clerck - Opera citata*, p. 138, pl. VI, tab. 4).  
*Habitat*: Europa. Algeria. Palestina.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana, Campania, Sardegna, Corsica.  
*Località calabre*: Dintorni di Arena.

II.<sup>o</sup> Gen. **Olios** Wlk.

56. **Olios spongitaris**, Duf. 1820 (sub: *Micrommata*) - (*Dufour I. - Descr. de six arachn. nouv.*, in Ann. gen. sc. phys., p. 12, tav. LXIX, fig. 6).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Istria, Toscana, Campania, Basilicata, Sicilia, Corsica, Capri.

*Località calabre*: Dintorni di Arena. Orto Versace in Baguara. Palizzi.

V.<sup>a</sup> FAM. THOMISIDÆ.I.<sup>o</sup> Gen. **Xysticus** C. K.

57. **Xysticus eristatus**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerk Opera citata*, p. 136, pl. VI, tab. 6).

*Habitat*: Europa. Turchestan. Yarkand. Jenisei. Cina.

*Distribuzione in Italia*: Lombardia, Trentino, Veneto, Monte Catria, Toscana, Corsica.

*Località calabre*: Monte Poro.

58. **Xysticus Kochi**, Thor. 1872 (*Thorell - Rem. cit.*, p. 239).

*Habitat*: Europa media. Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Istria, Emilia, Liguria, Toscana, Agro Romano, Campania, Sardegna, Corsica.

*Località calabre*: Catanzaro. Rudevi di Rocca Angitola. Colle di Pizzo. Mileto. Monte Poro. Monte Consolino presso Stilo. Oliveti presso Palmi. Castello di Scilla. Cima di Montalto. Monte Covolo. Palizzi.

59. **Xysticus parallelus**, Sim. 1873 (*Simon E. - Ann. Soc. Ent. Fr.*, s. V, t. III, p. 390, tav. X, fig. 6, 7, Paris 1873).

*Habitat*: Francia. Pirenei.

*Distribuzione in Italia*: Corsica.

*Località calabre*: Dintorni di Arena. Foreste della Mongiana.

II.<sup>o</sup> Gen. **Synema** Sim.

60. **Synema globosum**, Fabr. 1775 (sub: *Aranea*) - (*Fabricius J. G. - Sist. entom.*, p. 432).

*Habitat*: Europa. Africa settentrionale. Capo B. Speranza. Candia. Palesstina. Rio Janeiro.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Istria, Emilia, Liguria, Toscana, Campania, Vulture, Puglia, Sicilia, Sardegna, Corsica, Elba, Gorgona, Capri, Ischia.

*Località calabre*: Catanzaro. Rudevi di Rocca Angitola e S.ta Venera. Colle di Pizzo. Orto Alcalà al Pizzo. Marina di Bivona. Filandari. Mileto. Monte Poro. Piana di Ravello. Arena. Monte Stella presso Stilo. Oliveti presso Palmi. Camposanto dei colerosi a Baguara. Cima di Montalto. Casino Rossi a Bagaladi. Roccaforte. Condofuri. Palizzi.

III.<sup>o</sup> Gen. **Meriaeus** Sim.

61. **Meriaeus Savignyi**, Sim. 1875 (*Simon E. - Arachn. de Fr.*, II, p. 205, tav. VII, fig. 6).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Nizza, Toscana, Avellana, Sicilia, Corsica, Capri, Ischia, S. Pietro.

*Località calabre*: Colle di Pizzo. Mileto. Piana di Ravello. Monte Poro. Colle Pettarello. Nicotera. Arepa. Monasterace. Oliveti presso Palmi. Lungo la consolare tra Ceramide e Pellegrina. Poggio di S. Lorenzo. Palizzi.

IV.<sup>o</sup> Gen. **Oxyptila** Sim.

62. **Oxyptila brevipes**, H. 1831 (sub: *Thomisus*) - (*Hahn W. - Die Arach.*, I, p. 30, fig. 25).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia.

*Località calabre*: Dintorni di Palizzi.

63. **Oxyptila praticola**, C. K. 1837 (sub: *Xysticus*) - (*Koch C. L. - Arachn. cit.*, IV, p. 77, fig. 300, 301).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Lombardia, Trentino, Veneto.

*Località calabre*: Dintorni di Arena. Casino Rossi a Bagaladi.

V.<sup>o</sup> Gen. **Dicaea** Sim.

64. **Dicaea dorsata**, Fabr. 1777 (sub: *Aranea*) - (*Fabricius J. G. - Gen. insect.*, p. 249, Chilonii 1777).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Lombardia.

*Località calabre*: Dintorni di Arena. Oliveti presso Mileto. Foreste della Mongiana.

VI.<sup>o</sup> Gen. **Thomisus** Wlk.

65. **Thomisus albus**, Gmel 1767 (sub: *Aranea*) - (*Gmelin Linnaeus - Syst. nat.*, ed. XII, I, p. 2964, Parisii 1767).

*Habitat*: Europa media. Regione mediterranea e transaspiana. Africa orientale. Singapore. Giava. Cina.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Istria, Emilia, Liguria, Toscana, Roma, Campania, Vulture, Puglia, Sicilia, Sardegna, Corsica, Pianosa, Capri, Ischia, Ustica, S. Pietro.

*Località calabre*: Piano e varco del Pollino. Catanzaro. Spiaggia dell'Angitola. Ruderì di Rocca Angitola. Orto Alcala e Colle di Pizzo. Mileto. Monte Poro. Colle Pettarello. Casino Rossi a Bagaladi. Poggio S. Lorenzo. Condofuri Palizzi.

66. **Thomisus hilarulus**, Sim. 1875 (*Simon E. - Arach. de Fr.*, I, p. 252).

*Habitat*: Africa settentrionale.

*Distribuzione in Italia*: Nizza, Sicilia.

*Località calabre*: Monte Poro. Monte Covolo presso Palizzi.

VII.<sup>o</sup> Gen. **Runcinia** Sim.

67. **Runcinia lateralis**, C. K. 1838 (sub: *Thomisus*) - (*Koch C. L. - Arach.*, IV, p. 28, fig. 277).

*Habitat*: Russia meridionale. Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte. Canton Ticino, Lombardia, Istria, Toscana, Vulture, Sicilia, Sardegna, Corsica, Ischia, S. Pietro.

*Località calabre*: Piana di Ravello. Dintorni di Arena. Monte Consolino a Sילו. Alle « *Pietre nigre* » nei dintorni di Palmi. Camposanto dei colerosi a Bagnaru. Monte Covolo. Palizzi.

VIII.<sup>o</sup> Gen. **Monaeses** Sim.

68. **Monaeses Leo**, n. sp.

*Cephalothorace tibia cum patella I multo brevior, helvolo, testaceo - variato et - lineato; pedibus testaceis, crinibus obscuris diffusis; abdomine longo et angustato, postice ferente tuberculum rugosum et conicum, fulvo-canescente, frequentibus punctis ornato: zona dorsali et ventrali helvola, lateraibus albis.*  
♀ ad. long. circa 7  $\frac{1}{2}$  mm.

Un solo esemplare femmina raccolto nei dintorni di Palizzi nel Giugno 1877.

*Cephalothorace*, lungo 2 mm., largo 1 mm., molto più breve della tibia e patella I, sparso di peli neri, di color lionato: nella parte toracica presenta una linea testacea trasversale, sulla parte mediana della quale si incontrano altre linee testacee, una diretta in avanti, due più lunghe, racchiudenti uno spazio a forma di cuore, che vanno fino agli occhi laterali posteriori, due brevi dirette all'indietro.

*Clipeo* lionato, proclive, un po' più lungo della distanza fra gli occhi mediani anteriori e i posteriori.

*Occhi* neri sopra una prominenza bianco-cerulea: prima serie in linea quasi retta, equidistanti, i mediani poco più piccoli dei laterali; seconda serie i laterali doppi dei mediani, mediani più distanti fra loro che dai laterali.

*Mandibole* d'una metà più lunghe del clipeo, proclivi, di color lionato, con una linea supero-interna testacea, assai perlose in avanti.

*Sterno* testaceo con margini bruni.

*Labbro* e *mascelle* testacee.

*Palpi* testacei inferiormente, cecati e setolosi superiormente.

Zampe testacee con punti e peli neri: metatarsi I rossastri; I 8 mm., II 7  $\frac{1}{4}$  mm., III e IV 4 mm.; zampe anteriori più robuste con 3 spine tibiali esterne.

Addome lungo (3  $\frac{1}{2}$  mm.), circa triplo della larghezza, tronco alla base, terminato da un cono (2  $\frac{1}{2}$  mm.) trasversalmente rugoso, ricurvo in basso e a destra: dorso giallo chiaro, con due serie longitudinali di setole curve all'indietro e sorgenti da macchie nerastre, ornato da frequentissimi punti oscuri disposti in linee longitudinali; una fascia longitudinale, stretta, dello stesso colore dei punti, oltrepassa appena la metà dell'addome; ventre con una fascia mediana stretta, fulva, estesa dall'epigino alle filiere; ai lati di questa il campo è giallo chiaro, diviso da linee longitudinali, costituite alternativamente da punti molto ravvicinati ovvero discosti; fianchi con zona longitudinale bianca che arriva al cono, limitata da due serie lineari di punti molto ravvicinati. Filiere brune.

#### IX.º Gen. **Pistius** Sim.

69. **Pistius truncatus**, Pall. 1772 (sub: *Araña*) - (*Palas P. G. - Spicil. zool.*, IX, p. 47, tav. I, fig. 15).

*Habitat*: Europa. Africa settentrionale. Palestina.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Isria, Emilia, Liguria, Toscana, Sicilia, Corsica.

*Località calabre*: Dintorni di Arena.

#### X.º Gen. **Philodromus** Wlk.

70. **Philodromus aurculus**, Cl. 1757 (sub: *Araña*) - (*Clerck - Opera citata*, p. 133, pl. VI, tab. 9).

*Habitat*: Europa. Tunisia.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Napolitano, Sicilia, Sardegna, Corsica.

*Località calabre*: Dintorni di Arena. Casino Rossi a Bagaladi. Palizzi.

71. **Philodromus bistigma**, Sim. 1870 (*Simon Z. - Aran. nouv. ou peu connus*, I, p. 72, tav. III, fig. 17, Liege 1870-1873).

*Habitat*: Spagna. Marocco.

*Distribuzione in Italia*: Vulture, Sicilia, Corsica.

*Località calabre*: Monte Porò. Arena. Monte Consolino, presso Stilo. Casino Rossi a Bagaladi. Palizzi, dintorni e Monte Covolo.

72. **Philodromus constellatus**, Sim. 1875 (*Simon Z. - Aran. de Fr.*, II, p. 298).

*Habitat*: Francia.

*Distribuzione in Italia*: Agro Romano, Corsica.

*Località calabre*: Piano e vareo del Pollino. Colle di Pizzo.

73. **Philodromus rufus**, Wlk. 1825 (*Walckenaer - Aran. de Fr.*, p. 91, n. 4).

*Habitat*: Europa meridionale.

*Distribuzione in Italia*: Toscana, Corsica.

*Località calabre*: Raderi di Rocca Angitola. Oliveti presso Palmi.

74. **Philodromus vagulus**, Sim. 1875 (*Simon Z. - Aran. de Fr.*, II, p. 305).

*Habitat*: Francia.

*Distribuzione in Italia*: Ricontrato per la prima volta.

*Località calabre*: Castagneto ceduo sopra Palmi. Dintorni di Palizzi.

#### XI.º Gen. **Tibellus** Sim.

75. **Tibellus macellus**, Sim. 1875 (*Simon Z. - Aran. de Fr.*, II, p. 308).

*Habitat*: Francia.

*Distribuzione in Italia*: Corsica.

*Località calabre*: Spiaggia dell'Angitola. Dintorni di Palizzi.

76. **Tibellus oblongus**, Wlk. 1802 (sub: *Araña*) - (*Walckenaer - Faune Paris*, II, p. 228).

*Habitat*: Europa. Regione mediterranea e transcaucasiana. Cina. America Settentrionale.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Napolitano.  
*Località calabre*: Spiaggia dell' Angitola. Colle di Pizzo. Dintorni di Mileto e di Palizzi.

XII.<sup>o</sup> Gen. **Thanatus** C. K.

77. **Thanatus vulgaris**, Sim. 1870 (*Simon Z.* - *Aran. novae*, I, p. 60, tav. VIII, fig. 17).

*Habitat*: Regione mediterranea.  
*Distribuzione in Italia*: Sicilia, Sardegna, Corsica.  
*Località calabre*: Dintorni di Arena e di Palizzi.

VI.<sup>a</sup> FAM. PALPIMANIDÆ.

Gen. **Palpimanus** Duf.

78. **Palpimanus gibbulus**, Duf. 1820 (*Dufour Z.* - *Descript. de six arach. nouv.*, IV, p. 364, tav. LIX, fig. 5).  
*Habitat*: Regione mediterranea. Abissinia. Nubia. Arabia. India.

*Distribuzione in Italia*: Sicilia, Sardegna, Ustica.  
*Località calabre*: Ruderi di Rocca Angitola. Altipiano del Monte Poro. Filandari. Monte Consolino. Palizzi.

VII.<sup>a</sup> FAM. ERESIDÆ.

Gen. **Eresus** Wik.

79. **Eresus Audouini**, Br. 1832 (*Brullé A.* - *Insect. de Morée*, p. 56, pl. XXVIII, fig. 10).

*Habitat*: Grecia. Dalmazia. Algeria.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Veneto, Istria, Toscana, Sicilia.  
*Località calabre*: Roccaforte. Palizzi e dintorni.

80. **Eresus Walckenaeri** Br. 1832 (*Brullé A.* - *Insect. d. Morée*, p. 51, pl. XXVIII, fig. 4).

*Habitat*: Grecia.  
*Distribuzione in Italia*: Sicilia.  
*Località calabre*: Colle presso il castello e dintorni di Palizzi.

VIII.<sup>a</sup> FAM. EPEIRIDÆ.

I.<sup>o</sup> Gen. **Peltosoma** Sim.

81. **Peltosoma tuberculiferum**, Sim. 1870 (*Simon Z.* - *Aran. novae. ou peu connus*, I, p. 48, tav. III, fig. 6, 7).

*Habitat*: Corsica.  
*Distribuzione in Italia*: Corsica.  
*Località calabre*: Dintorni di Palizzi.

II.<sup>o</sup> Gen. **Argiope** Aud. in Sav.

82.\* **Argiope Bruennichi**, Scop. 1772 (sub: *Aranca*) - (*Scopoli J.* - *Obs. zool.* in Ann. V, Hist. Nat., p. 125).

*Habitat*: Europa media e meridionale. Africa settentrionale. Hong-Kong. Giava. Giappone. Stati Uniti?  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Nizza, Liguria, Toscana, Campania, Sicilia, Sardegna, Corsica, Montecristo, Giannutri, Serpentara, Capri.  
*Località calabre*: Pizzo. Arena. Soriano. Monteleone. Reggio.

83. **Argiope lobata**, Pall. 1772 (sub: *Aranca*) - (*Pallas P. S.* - *Spicil. zool.*, I, p. 46, tav. III, fig. 14, 15).

*Habitat*: Europa media e meridionale. Africa. Asia.  
*Distribuzione in Italia*: Lombardia, Veneto, Istria, Nizza, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Corsica, Capraia, Topi, Pianosa, Giglio, Giannutri, Serpentara, Vacca, Linosa, Lampedusa, Capri, Ischia, Montecristo, Caprea, Ustica, Lipari.  
*Località calabre*: Pizzo. Monteleone. Arena. Palizzi.

III.<sup>o</sup> Gen. **Cyrtophora** Sim.

84. **Cyrtophora ciliaricola**, Forsk. 1775 (sub: *Aranca*) - (*Forskæl P.* - *Descript. anim.*, p. 86, n. 27).

*Habitat*: Europa meridionale. Africa. India. Is. Sechelles Brasile.  
*Distribuzione in Italia*: Campania, Sicilia, Sardegna, Corsica, Is. Salina, S. Pietro.  
*Località calabre*: Pizzo. Briatico. Orto Versace in Bagnara Nicotera. S.ta Eufemia. Scilla. Reggio.

IV.° Gen. **Cyclosa** Men.

85.\* **Cyclosa conica**, Pall. 1772 (sub: *Arauca*) - (*Pallas* P. S. - *Spicil. zool.*, I, p. 48, tav. I, fig. 16).

*Habitat*: Europa. Isole della Sonda.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana, Campania, Sardegna, Capraia, Capri.  
*Località calabre*: Monteleone. Arena. Serra S. Bruno.

86.\* **Cyclosa insulana**, O. G. Costa 1834 (sub: *Epeira*) - (*Costa O. G.* - *Annuaire zool.*, p. 65).

*Habitat*: Spagna. Algeria. Tunisia.  
*Distribuzione in Italia*: Sicilia, Sardegna, Corsica, Elba, Pianosa, Giannutri, Serpentara, Caprera, Capri.  
*Località calabre*: Arena.

87. **Cyclosa Sierrae**, Sim. 1870 (*Simon E.* - *Aran. novae* ou *peu connus*, I, p. 40).

*Habitat*: Spagna. Siria.  
*Distribuzione in Italia*: Tirolo, Corsica, Ischia.  
*Località calabre*: Catanzaro. Colle di Pizzo. Pianna sotto il Monte Porò. Mileto. Olivedi presso Palmi. S.ta Eufemia. Piani della Melia. Casino Rossi a Bagaladi. Palizzi.

V.° Gen. **Epeira** Wik.

88. **Epeira acalypha**, Wik. 1802 (sub: *Arauca*) - (*Walckenaer* - *Faune Paris*, p. 199).

*Habitat*: Europa. Madera. Azzorre.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana, Vulture, Si-

ilia, Sardegna, Elba, Montecristo, Giglio, Capraia, Ischia, Salina.

*Località calabre*: Catanzaro. Ruderì di Rocca Angitola e di S.ta Venera. Colle di Pizzo. Mileto. Monte Porò. Nicotera. Olivedi presso Palmi. Bagnara: Casino De-Leo, Camposanto dei colerosi. Casino Rossi a Bagaladi. Roccaforte. Monte Cavaliere. Palizzi. Monteleone. Arena. Foreste della Mongiana. Monteleone.

89. **Epeira adianta**, Wik. 1802 (*Walckenaer* - *Faune Paris*, p. 199).

*Habitat*: Europa. Africa settentrionale. Turkestan. Jenisei. Cina. Giappone. Cili.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna, Corsica, Elba, Giglio, Capraia, Caprera, Ischia, Capri.

*Località calabre*: Catanzaro. Colle di Pizzo. Monteleone. Arena. Mileto. Nicotera. Monte Porò. Colle Pettarello. Olivedi presso Palmi. Poggio S. Lorenzo. Roccaforte. Monte Covolo. Palizzi.

90. **Epeira angulata**, Cl. 1757 (sub: *Araucus*) - (*Clerck Opera citata*, p. 22, tav. I, fig. 1).

*Habitat*: Europa. Algeria. Turchia asiatica. Nuova Olanda. Isola della Sonda.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Trieste, Emilia, Toscana, Campania, Basilicata, Ustica.

*Località calabre*: Catanzaro. Arena. Monte Stella. presso Stilo.  
 NB. Anche la **Epeira angulata** var. **pinctorum** C. K. 1845 (*Koch. C. Lj - Arachn.*, XI, p. 95, fig. 904, 905), vive in Calabria, avendo io ricevuto un esemplare raccolto nei dintorni di Palizzi.

91. **Epeira Armida**, Aud. in Sav. 1825 (*Audouin in Savigny - Descr. de l'Egypte*, XXII, p. 337, tav. II, fig. 8).  
*Habitat*: Europa. Africa settentrionale.

- Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Nizza, Corsica, Capraia, Giglio.  
*Località calabre*: Colle Pettarello presso Nicotera. Poggio di S. Lorenzo. Casino Rossi a Bagaladi.
- 92.\* **Epeira ceropogia**, Wlk. 1802 (sub: *Aranea*) - (*Walckenaer* - *Faune Paris*, II, p. 199).  
*Habitat*: Europa. Regione transalpina. Mongolia. Kamsciata. America settentrionale.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Sicilia.  
*Località calabre*: Pizzo. Arena.
93. **Epeira cornuta**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerck* - *Opera citata*, p. 39, pl. I, tab. 11).  
*Habitat*: Europa. Africa settentrionale. Asia.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana, Campania, Vulture, Sicilia, Sardegna.  
*Località calabre*: Viottola di Flandari. Arena.
94. **Epeira eucurbitina**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerck* - *Opera citata*, p. 44, pl. II, tab. 4).  
*Habitat*: Europa. Africa settentrionale. Palestina. America settentrionale.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Istria, Emilia, Toscana, Avellana, Sicilia, Sardegna, Ischia, Capri.  
*Località calabre*: Catanzaro. Piana di Ravello. Soriano. Arena. Oliveti e Castagneto ceduo presso Palmi. Circa di Montalto. Monte Cavaliere (Aspromonte). Roccaforte. Monte Covolo. Palizzi.
- 95.\* **Epeira diadema**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerck* - *Opera citata*, p. 25, pl. I, tab. 4).  
*Habitat*: Europa. Siberia. Mongolia. Kamsciata. Egitto. Cili. Islanda. Groenlandia.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana, Campania, Sardegna, Capraia, Montecristo, Capri.  
*Località calabre*: Monteleone. Soriano. Arena. Reggio.

96. **Epeira diodia**, Wlk. 1802 (sub: *Aranea*) - (*Walckenaer* - *Faune Paris*, p. 200).  
*Habitat*: Europa media e meridionale. Tunisia.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana, Avellana, Campania, Sicilia, Sardegna, Ischia.  
*Località calabre*: Colle di Pizzo. Arena. Mileto. Castagneto sopra Palmi. Piano e grotta della Melia. Casino Rossi a Bagaladi.
97. **Epeira dromedaria**, Wlk. 1802 (sub: *Aranea*) - (*Walckenaer* - *Faune Paris*, p. 191, n. 6).  
*Habitat*: Europa. Egitto. Palestina.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Emilia, Toscana, Agro Romano, Campania, Sicilia, Sardegna, Ischia, Capri.  
*Località calabre*: Catanzaro. Colle di Pizzo. Mileto. Monte Poro. Colle Pettarello, presso Nicotera. Arena. Monasterace. Oliveti e castagneto presso Palmi. Camposanto dei colerosi a Bagaladi. Roccaforte.
- 98.\* **Epeira sigas**, C. K. 1834 (*Koch C. L. in H. Schaeff* - *Deuts. Ins. H.*, 129, p. 21).  
*Habitat*: Francia. Austria. Ungheria.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Trentino, Emilia.  
*Località calabre*: Piano e varco del Pollino.
- 99.\* **Epeira marmorata**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerck* - *Opera citata*, p. 29, pl. I, tab. 2).  
*Habitat*: Europa. Siberia orientale. Stati Uniti?  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Sicilia.  
*Località calabre*: Arena.
100. **Epeira patagiata**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerck* - *Opera citata*, p. 38, pl. I, tab. 10).  
*Habitat*: Europa. America settentrionale.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto.  
*Località calabre*: Spiaggia dell'Angitola.

101. **Epeira Redii**, Scop. 1763 (*Scopoli J.* - *Entom. carn.*, p. 394).

*Habitat*: Europa media e meridionale. Africa settentrionale e equatoriale. Palestina. Penisola Sinaitica. Indie orientali.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna, Corsica, Capri, S. Pietro.

*Località calabre*: Catanzaro. Ruderi di Rocca Angitola e di S.ta Venera. Colle di Pizzo. Filandari. Mileto. Arena. Monte Poro. Nicotera. Poggio di S. Lorenzo. Bagaladi. Palizzi.

102.\* **Epeira umbratica**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerck* - *Opera citata*, p. 31, pl. I, tab. 7).

*Habitat*: Europa. Madera. Algeria. Egitto.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Liguria, Campania.

*Località calabre*: Arena.

#### VII.<sup>o</sup> Gen. **Singa** C. K.

103. **Singa Merii**, H. 1831 (sub: *Epeira*) - (*Hahn W.* - *Arachn.*, I, p. 8, fig. 5).

*Habitat*: Europa centrale e meridionale.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Campania, Sicilia, S. Pietro.

*Località calabre*: Spiaggia dell'Angitola.

104. **Singa sanguinea**, C. K. 1845 (*Koch. C. L.* - *Arachn.*, XI, p. 155, fig. 951).

*Habitat*: Europa centrale e meridionale.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Roma.

*Località calabre*: Spiaggia dell'Angitola.

#### VIII.<sup>o</sup> Gen. **Zilla** C. K.

105. **Zilla atrica**, C. K. 1845 (sub: *Eucharis*) - (*Koch C. L.* - *Arachn.*, XII, p. 103, fig. 1030, 1031).

*Habitat*: Europa centrale e meridionale.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Liguria, Toscana, Campania, Vulture, Capri, Ischia, San Pietro.

*Località calabre*: Rovine di S.ta Venera. Arena. Dintorni di Palizzi.

106. **Zilla x-notata**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerck* - *Opera citata*, p. 46, pl. II, tab. 5).

*Habitat*: Europa media e meridionale. Algeria.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Liguria, Agro Romano, Campania, Sicilia, Capraia, Pianosa, Spinoso, Capri.

*Località calabre*: Colle di Pizzo.

#### VIII.<sup>o</sup> Gen. **Meta** C. K.

107. **Meta Menardi**, Latr. 1804 (sub: *Aranea*) - (*Latr. inelle* - *Tabl. metod. des ins.*, p. 108, n. 12).

*Habitat*: Svezia. Europa centrale e meridionale.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia, Veneto, Liguria.

*Località calabre*: Grotta della Lamia, presso Bagaladi.

108. **Meta Merianne**, Scop. 1763 (sub: *Aranea*) - (*Scopoli* - *Entom. carn.*, p. 395).

*Habitat*: Europa. Isole Azzorre.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana, Campania, Sicilia, Sardegna, Montecristo, Pianosa, Ischia, Capri.

*Località calabre*: Catanzaro. Colle di Pizzo. Grotta di tufo sulla spiaggia di Pizzo. Ruderi di S.ta Venera. Mileto. Sottoranei del convento di S. Domenico a Soriano. Arena. Orti di Palmi. Bagnara: orti De-Leo; presso il cimitero nuovo. Grotta della Melia, presso Scilla. Piani di Sclanu. Palizzi: dintorni e piccola grotta sotto l'abitato.

109. **Meta segmentata**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerck* - *Opera citata*, p. 45, pl. II, tab. 6).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Nizza, Toscana, Avellana, Campania, Sicilia, Sardegna, Capri, Ischia.  
*Località calabre*: Lungo la via in basso del Colle di Pizzo. Arena. Foreste della Mongiana.

IX.<sup>o</sup> Gen. **Tetragnatha** Latr.

110. **Tetragnatha extensa**, L. 1758 (sub: *Araña*) - (*Linnaeus - Syst. nat.*, ed. X, p. 621).

*Habitat*: Europa. Regioni mediterranea e transalpina. Siberia orientale. Mongolia. America settentrionale.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Nizza, Toscana, Campania, Vulture, Sicilia, Sardegna, Ischia, Capri.

*Località calabre*: Catanzaro. Colle di Pizzo, dietro il quartier militare. Marina di Bivona. Monteleone. Arena. Nicotera.

111. **Tetragnatha montana**, Sim. 1874 (*Sémone - Arch. de Fr.*, I, p. 157, fig. 16).

*Habitat*: Francia.

*Distribuzione in Italia*: Ischia.

*Località calabre*: Mileto: Dintorni e letto asciutto del torrente Mammella. Palizzi.

112. **Tetragnatha nitens**, And. in Sav. 1827 (sub: *Eugnatha*) - (*Audouin in Savigny - Descr. de l'Égypte*, XXII, p. 323, tav. II, fig. 2).

*Habitat*: Francia. Tunisia. Egitto.

*Distribuzione in Italia*: Corsica.

*Località calabre*: Spiaggia dell'Angitola. Nicotera. Palizzi.

X.<sup>o</sup> Gen. **Pachygnatha** Sund.

113.\* **Pachygnatha Clerckii**, Sund. 1823 (*Sunderall - Spec. Acad. Gen. Aran. Suec. exhibens*, p. 16).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Emilia.

*Località calabre*: Arena.

114. **Pachygnatha De-Geeri**, Sund. 1830 (*Sunderall - Svenska spindl.*, p. 211).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana, Caserta.  
*Località calabre*: Non è indicata.

IX.<sup>a</sup> FAM: ULOBORIDÆ.

I.<sup>o</sup> Gen. **Uloborus** Latr.

115. **Uloborus plumipes**, Luc. 1842 (*Lucas - Explor. de l'Algérie*, I, p. 252, tav. XV, fig. 8).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Alpi marittime, Campania, Sicilia, Corsica, Capri, Ischia.

*Località calabre*: Nicotera. Lungo la via da Bagnara a Scilla, sotto un arco del viadotto. Casino Rossi a Bagaladi.

116. **Uloborus Walckenaeri**, Latr. 1806 (*Latreille - Gen. crust. et ins.*, I, p. 110).

*Habitat*: Europa media. Regioni mediterranea e transalpina.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana, Campania, Sardegna, Corsica, Ischia.

*Località calabre*: Arena. Palizzi, lungo il fiume.

II.<sup>o</sup> Gen. **Hypitotes** Wlk.

117.\* **Hypitotes paradoxus**, C. K. 1834 (sub: *Mithras*) - (*Koch C. L. in H. Schaeff Deuts. Ins.*, 123, 9).

*Habitat*: Europa centrale e meridionale.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Lombardia, Trentino, Liguria, Toscana, Corsica.

*Località calabre*: Arena.

## X. FAM. THERIDIIONIDÆ.

I.º Gen. **Argyrodes** Sim.

118. **Argyrodes Argyrodes**, Wlk. 1837 (sub: *Linyphia*) - (*Walckenaer* - *Ins. apter.*, I, p. 283).  
*Habitat*: Sottoregioni mediterranea, malgascia, indomalese, etiopico-atlantica, brasiliana, alleghiana.  
*Distribuzione in Italia*: Italia meridionale, Sicilia, Sardegna, Corsica, Montecristo, Serpentara.  
*Località calabre*: dintorni di Arena.

II.º Gen. **Formicina** Can.

119. **Formicina mutinensis**, Can. 1868 (*Canestrini* - *Nuovi Aracn. Ital.*, p. 197).  
*Habitat*: Italia. Francia.  
*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia, Emilia, Nizza, Liguria, Toscana, Corsica.  
*Località calabre*: Arena e dintorni.

III.º Gen. **Mimetus** Hentz.

120. **Mimetus intersector**, Hentz 1850 (*Hentz N. M. Aracn. of the U. S. A.*, VI, p. 33, tav. IV, fig. 12, 13).  
*Habitat*: Regione mediterranea. Stati Uniti.  
*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia, Campania, Sicilia, Corsica, Ischia.  
*Località calabre*: Catanzaro. Colle di Pizzo. Arena. Castagneto sopra Palmi. Dintorni di Palizzi.

IV.º Gen. **Ero** C. K.

121. **Ero aphanus**, Wlk. 1802 (sub: *Aranea*) - (*Walckenaer* - *Faune Paris*, II, p. 206).  
*Habitat*: Spagna. Francia. Germania.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Lombardia, Toscana, Corsica.  
*Località calabre*: Arena e dintorni.

V.º Gen. **Episius** Wlk.

122. **Episius truncatus**, Wlk. 1809 (*Walckenaer* - *Ins. apt.*, II, p. 375, tav. XXI, fig. 1).  
*Habitat*: Europa. Africa settentrionale.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Liguria, Campania, Sardegna, Corsica, Capri.  
*Località calabre*: Colle di Pizzo. Arena e dintorni. Orto De-Leo in Bagnaru. Presso la grotta della Melia (Scilla).

VI.º Gen. **Nesticus** Thor.

123. **Nesticus cellulanus**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerck* - *Opera citata*, p. 62, tav. IV, fig. 12).  
*Habitat*: Europa.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Liguria, Ischia.  
*Località calabre*: In una piccola grotta sotto Palizzi.

VII.º Gen. **Theridion** Wlk.

124. **Theridion aulicum**, C. K. 1838 (*Koch C. L. Arachn.*, IV, p. 115, fig. 323).  
*Habitat*: Inghilterra. Regione mediterranea. Is. Sechelles.  
*Distribuzione in Italia*: Toscana, Roma, Sicilia, Corsica, San Pietro.  
*Località calabre*: Ruderì di Rocca Angitola e di S.ta Venera; Colle di Pizzo. Monte Poro. Nicotera, Bagnara: orti De-Leo e Versace; canposanto dei colerosi. Palizzi.  
 125. **Theridion formosum**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerck* - *Opera citata*, p. 56, pl. III, tab. 6).  
*Habitat*: Europa. Siberia orientale. India. Cina. Canada.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana, Campania, Sicilia, Corsica, Capri.  
*Località calabre*: Arena.

126. **Theridion lineatum**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) -  
(Clerck - *Opera citata*, p. 60, pl. III, tab. 10).

*Habitat*: Europa. Stati Uniti.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Liguria, Campania, Basilicata, Sardegna, Corsica.

*Località calabre*: Colle di Pizzo. Monte Poro. Colle Petterello, presso Nicotera. Arena. Foreste della Mongiana. Monte Cavaliere (Aspromonte). Palizzi.

127. **Theridion nigro-punctatum**, Luc. 1842 (*Lucas*  
- *Explor. de l'Algérie*, I, p. 266, tav. XVI, fig. 6).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Sicilia, Corsica.

*Località calabre*: Pressi di Nicotera.

128. **Theridion pulchellum**, Wlk. 1802 (sub: *Aranea*)  
- *Walckenaer - Faune Paris*, p. 208).

*Habitat*: Svezia. Francia. Dalmazia.

*Distribuzione in Italia*: Lombardia, Liguria, Sicilia, Corsica.  
*Località calabre*: Dal piano a mezzacosta del Monte Poro.

129. **Theridion simile**, C. K. 1836 (*Koch C. L. - Arachn.*,  
III, p. 62, fig. 215; VIII, p. 39, fig. 649).

*Habitat*: Europa. Africa settentrionale, Siria e Palestina.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Toscana, Corsica,  
Ischia.

*Località calabre*: Monte Poro. Monte Cavaliere (Aspromonte).  
Palizzi.

130. **Theridion varians**, H. 1831 (*Hahn - Arachn.*, I,  
p. 93, fig. 71-72).

*Habitat*: Europa. Algeria. Siria.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Corsica.

*Località calabre*: Piana di Ravello. Nicotera.

VIII.º Gen. **Dipoena** Thor.

131. **Dipoena leucoplagiata**, Sim. 1879 (*Simon - Arachn. de Fr.*, V, p. 117, tav. XXVI, fig. 2).

*Habitat*: Francia.

*Distribuzione in Italia*: Ricontrato per la prima volta.

*Località calabre*: Arena e dintorni.

IX.º Gen. **Oroodes** Sim.

132.\* **Oroodes paradoxus**, Luc. 1842 (sub: *Epeira*) -  
(*Lucas - Explor. de l'Algérie*, I, p. 251, tav. 15, fig. 7).

*Habitat*: Francia. Algeria.

*Distribuzione in Italia*: Corsica.

*Località calabre*: Arena e dintorni.

X.º Gen. **Euryopsis** Men.

133. **Euryopsis acuminata**, Luc. 1842 (sub: *Theridion*)  
- (*Lucas - Explor. de l'Algérie*, I, p. 268, tav. XVII, fig. 10).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Lombardia, Veneto, Corsica, Ischia.

*Località calabre*: Strada di Porto S.ta Venera. Monte Poro.  
Orti di Mileto. Arena. Valletta della grotta della Melia. Palizzi.

XI.º Gen. **Teutana** Sim.

134. **Teutana grossa**, C. K. 1838 (sub: *Theridium*)  
(*Koch C. L. - Arachn.*, III, p. 112, fig. 321).

*Habitat*: Inghilterra. Europa centrale. Regione mediterr.

*Distribuzione in Italia*: Trentino, Campania, Corsica.

*Località calabre*: Colle di Pizzo. Casino Gagliardi sul monte  
Poro.

XII.º Gen. **Lithyphantes** Thor.

135. **Lithyphantes corollatus**, L. 1758 (sub: *Aranea*)  
- (*Linnaeus - Syst. nat.*, ed. X, I, p. 621).

*Habitat*: Europa. America settentrionale. Jenisei. Turche-  
stan. Mongolia.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Lombardia, Emilia, Sar-  
degn.

*Località calabre*: Arena. Cima di Montalto. Monte Pierra Cappella, reg. Nardello (Aspromonte).

136. **Lithyphantès paykullianus**, Wlk. 1805 (sub: *Theridion*) - (*Walckenaer* - *Ins. apt.*, II, p. 296).

*Habitat*: Regioni mediterranea e transalpina.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia, Emilia, Liguria, Toscana, Roma, Campania, Sicilia, Sardegna, Corsica, Capri; Asinara, S. Antioco.

*Località calabre*: Spinggia e colle di Pizzo. Casino Corso sul monte Poro. Mileto. Arena.

#### XIII.º Gen. **Asagena** Sund.

137. **Asagena phalerata**, Panz. 1801 (sub: *Phalangium*) - (*Panzer* - *Faun. ins. Germ. init.*, p. 78, n. 21).

*Habitat*: Europa media e meridionale.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana, Puglia, Sicilia, Corsica, Capri.

*Località calabre*: Ruderi di S.ta Venera.

#### XIV.º Gen. **Latroedectus** Wlk.

138. **Latroedectus tredecimcintatus**, Rossi 1790 (sub: *Aranea*) - (*Rossi* - *Fraus etrusca*, II, p. 136, tav. IX, fig. 10).

*Habitat*: Europa media. Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Corsica, Capri, Elba, Lampedusa, Gerba, Porto Santo.

*Località calabre*: Spinggia dell'Angitola. Piana sotto monte Poro.

#### XV.º Gen. **Enoplognatha** Pavs.

139. **Enoplognatha mandibularis**, Luc. 1842 (sub: *Theridion*) - (*Lucas* - *Explor. de l'Algérie*, p. 260, tav. XVII, fig. 1).

*Habitat*: Regione mediterranea. Arabia meridionale. Cina.

*Distribuzione in Italia*: Nizza, Roma, Campania, Sicilia, Corsica, Capri, Lavesi.

*Località calabre*: Spiaggia e colle di Pizzo. Monte Poro. Arena.

#### XVI.º Gen. **Linyphia** Latr.

140. **Linyphia frutetorum**, C. K. 1834 (*Koch C. L. Arachn.*, XII, p. 123, fig. 1044, 1045).

*Habitat*: Europa media. Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Toscana, Campania, Corsica.

*Località calabre*: Colle di Pizzo. Rovine di S.ta Venera. Mileto. Monte Poro. Nicotera. Arena. Foreste della Mongiana. Stilo. Orto De-Leo in Bagnara. Lungo la via da Bagnara a Scilla. Casino Rossi. a Bagaladi. Palizzi.

141. **Linyphia lineata**, L. 1758 (sub: *Aranea*) - (*Leinaeus* - *Syst. nat.*, ed. X, t. I, p. 620).

*Habitat*: Europa. Africa settentrionale. Stati Uniti.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Monte Catria, Emilia, Campania, Vulture, Corsica.

*Località calabre*: Arena e dintorni.

142. **Linyphia marginata**, C. K. 1844 (*Koch C. L. Arachn.*, XII, p. 118, fig. 1041, 1042).

*Habitat*: Europa. Stati Uniti.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Campania.

*Località calabre*: Piana di Ravello.

143. **Linyphia pusilla**, Sund. 1830 (*Sundervall - Svenska spindl.*, p. 214).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Corsica.

*Località calabre*: Arena e dintorni.

144. **Linyphia triangularis**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerck* - *Opera citata* - p. 71, pl. II, tab. 2, fig. 1).

*Habitat*: Europa. Barberia. Siberia. Jenisei. Mongolia.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Nizza, Liguria, Toscana, Campania, Corsica, Capri, Ischia.

*Località calabre*: Monte Poro. Palizzi.

XVII.<sup>o</sup> Gen. **Leplyphantes** Men.

145. **Leplyphantes tenebricola**, Wid. 1834 (sub: *Linyphia*) - (*Wider u. Reuss.* - *Arachn.*, I, p. 260, tav. XVIII, fig. 2).  
*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Campania, Puglia, Corsica, Capri.

*Località calabre*: Lungo la via da Bagnara a Scilla, sotto un arco del viadotto.

XVIII.<sup>o</sup> Gen. **Erigone** Aud. in Sav.

146. **Erigone dentipalpis**, Wid. 1834 (sub: *Theridium*) - (*Wider u. Reuss.* - *Arachn.*, I, p. 222, tav. XVII, fig. 1).

*Habitat*: Europa. Africa settentrionale, Groenlandia.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Lombardia, Veneto.

*Località calabre*: Dal piano a mezzacosta del Monte Poro.

XIX.<sup>o</sup> Gen. **Prosopotheca** Sim.

147. **Prosopotheca monocerros**, Wid. 1834 (sub: *Theridium*) - (*Wider u. Reuss.* - *Arachn.*, I, p. 230, tav. XVI, fig. 3).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Nizza.

*Località calabre*: Arena e dintorni.

XI.<sup>a</sup> FAM. PHOLCIDÆ.I.<sup>o</sup> Gen. **Pholcus** Wlk.

148. **Pholcus phalangioides**, Fuess. 1775 (sub: *Aranea*) - (*Fuesslin J. C.* - *Schweitz. ins.*, p. 61).

*Habitat*: Europa media. Regione mediterranea. Is. S. Elena, Hong-Kong? Manilla? Singapore? Giava. Canadà.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Veneto, Emilia, Nizza, Liguria, Roma, Campania, Terra di Lavoro, Sardegna, Capri, Capreva, Pantelleria.

*Località calabre*: Pizzo: in una casa e in una escavazione nel tufo sulla spiaggia. Casino Gaggiardi sul Monte Poro. Mileto. Arena. Palizzi: dintorni e in una piccola grotta.

149. **Pholcus rivulatus**, Forsk. 1775 (sub: *Aranea*) - (*Forskael - Descript. anim.*, p. 86).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Veneto, Emilia, Campania, Sicilia, Sardegna, Corsica, Salsina, Lampedusa, Ustica.

*Località calabre*: Colle di Pizzo. Orti Alcatà di Pizzo. Orti di Mileto. Nicotera. Monte Stella, presso Sfilo. Lungo la via da Bagnara a Scilla. Casino Rossi a Bagaladi. Palizzi.

II.<sup>o</sup> Gen. **Spermophora** Hentz.

150. **Spermophora elevata**, Sim. 1873 (*Simon - Aran. nov.*, II, p. 50, tav. III, fig. 9, 10).

*Habitat*: Francia.

*Distribuzione in Italia*: Corsica, Capri.

*Località calabre*: Arena e dintorni. Palizzi.

XII.<sup>a</sup> FAM. HERSILIDÆ.

Non è rappresentata.

XIII.<sup>a</sup> FAM. UROCTEIDÆ.I.<sup>o</sup> Gen. **Uroctea** Duf.

151. **Uroctea Durandi**, Wlk. 1809 (sub: *Clotho*) - (*Walckenaer - Ins. apt.*, I, p. 636).

*Habitat*: Regione mediterranea. Cina. Giappone.

*Distribuzione in Italia*: Istria? Sicilia.

*Località calabre*: Oliveti presso Palmi. Orto Versace in Bagnara. Palizzi.

II.<sup>o</sup> Gen. **Oecobius** Luc.

152. **Oecobius annulipes**, Luc. 1842 (*Lucas - Explor. de l'Algérie*, I, p. 102, tav. II, fig. 2).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Sicilia, Corsica, Capri, Ischia.

*Località calabre*: Pendici erbose del colle di Pizzo.

153. **Oecobius cellariorum**, Dug. 1836 (sub: *Clotho*) - (*Duges in Ann. Sc. Nat.*, 1836, p. 161).

*Habitat*: Francia meridionale. Spagna. Algeria.

*Distribuzione in Italia*: Ricontrato per la prima volta.

*Località calabre*: Arena e dintorni.

XIV.<sup>a</sup> FAM. ENYIDÆ.Gen. **Enyo** Aud. in Sav.

154. **Enyo elegans**, Sim. 1873 (*Simon - Arach. nov.*, II, p. 56, tab. II, fig. 13, 14).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Nizza, Liguria, Sicilia, Corsica, Capri.

*Località calabre*: Colle di Pizzo. Monte Murello, presso Rocca Angitola.

XV.<sup>a</sup> FAM. AGELENIDÆ.I.<sup>o</sup> Gen. **Coelotes** Bl.

155. **Coelotes atropis**, Wlk. 1825 (sub: *Drassus*) - (*Walckenaer - Arach. de Fr.*, p. 170).

*Habitat*: Europa centrale e meridionale. India.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Istria.

*Località calabre*: Foreste della Mongiana.

II.<sup>o</sup> Gen. **Tegenaria** Latr.

156. **Tegenaria campestris**, C. K. 1836 (sub: *Aranea*) - (*Koch C. L. - Arachn.*, VIII, p. 34, fig. 615, 616).

*Habitat*: Francia.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia, Emilia, Toscana, Campania.

*Località calabre*: Arena. Foreste della Mongiana.

157. **Tegenaria domestica**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerck - Opera citata*, p. 76, pl. II, tab. 9, fig. 2).

*Habitat*: Cosmopolita.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana, Campania, Sicilia, Sardegna.

*Località calabre*: Arena e dintorni.

158. **Tegenaria parietina**, Fourc. 1785 (sub: *Aranea*) - (*Fourcroy - Entom. paris. sec. Simon*).

*Habitat*: Europa media. Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Campania, Sicilia, Corsica, Capri, Ischia, Nisida, Pantelleria.

*Località calabre*: Catanzaro. Monte Poro. Arena. Stilo. Lungo la via da Bagnara a Scilla.

III.<sup>o</sup> Gen. **Agelena** Wlk.

159. **Agelena labyrinthica**, Cl. 1757 (sub: *Araneus*) - (*Clerck - Opera citata*, p. 79, pl. II, tab. 8).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Liguria, Campania, Vulture, Sicilia, Sardegna, Corsica, Ischia.

*Località calabre*: Mileto. Arena. Palizzi. Casino Rossi a Bagaladi.

IV.<sup>o</sup> Gen. **Textrix** Sund.

160. **Textrix caudata**, L. K. 1873 (*Koch C. L. - Arachn. fauna Tirol*, II, p. 283).

*Habitat*: Spagna. Francia. Tirolo.

*Distribuzione in Italia*: Veneto, Emilia, Toscana.

*Località calabre*: Foreste della Mongiana.

161. **Textrix conretata**, Duf. 1831 (sub: *Aranea*) - (*Dufour - Aran. nouv. ou peu connus*, p. 368, tav. X, fig. 1).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Mentone, Campania, Sicilia, Sardegna, Corsica, Vaeca, Capri, S. Antioco, Asinara, Lampedusa, S. Pietro, Ustica, Pantelleria.

*Località calabre*: Colle di Pizzo. Mileto. Foreste della Montagna. Monte Pecoraro. Monte Stilo. Monasterace. Palizzi.

162. **Textrix denticulata**, Oliv. 1789 (sub: *Aranea*) - (*Olivier A. - Encycl. met.*, IV, p. 213).

*Habitat*: Europa media e meridionale.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Avellana, Campania, Capri, Montecristo.

*Località calabre*: Arena. Orto e casino De-Leo a Bagnara. Casino Rossi a Bagaladi. Palizzi.

#### V.º Gen. **Hahnia** C. K.

163. **Hahnia elegans**, Bl. 1841 (sub: *Agelena*) - (*Blaquiacell - Spid. of. Gr. Br.*, I, p. 155, fig. 99).

*Habitat*: Inghilterra. Europa centrale e meridionale.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia, Liguria, Corsica.

*Località calabre*: Colle di Pizzo.

#### XVI.ª FAM. DICTYNIDÆ.

##### I.º Gen. **Dictyna**.

164. **Dictyna arundinacea**, L. 1758 (sub: *Aranea*) - (*Linnaeus - Syst. nat.*, I, p. 620).

*Habitat*: Europa. Palestina.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana, Campania, Sicilia, Corsica.

*Località calabre*: Monte Poro. Nicotera. Arena. Palizzi.

165. **Dictyna bicolor**, Sim. 1870 (*Simon - Aran. nouv.*, I, p. 30).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Corsica.

*Località calabre*: Nicotera.

166. **Dictyna globiceps**, Sim. 1870 (*Simon - Aran. nouv.*, I, p. 32, tav. I, fig. 24, 25).

*Habitat*: Spagna. Francia.

*Distribuzione in Italia*: Ricontrato per la prima volta.

*Località calabre*: Monte Poro. Alle *Pietre nigre* presso Palmi. Casino Rossi a Bagaladi. Palizzi.

167. **Dictyna latens**, Fabr. 1775 (sub: *Aranea*) - (*Fabricius J. - Syst. entom.*, p. 432).

*Habitat*: Germania. Francia. Dalmazia. Tunisia.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Veneto, Emilia, Capri, Ischia.

*Località calabre*: Piana sotto monte Poro.

168. **Dictyna mandibulosa**, Can. Pays. 1868 (*Candestrin e Pavesi - Aran. ital.*, p. 124).

*Habitat*: Italia.

*Distribuzione in Italia*: Veneto.

*Località calabre*: Dintorni di Palizzi.

169. **Dictyna vicina**, Sim. 1873 (*Simon - Aran. nouv.*, II, p. 148).

*Habitat*: Francia.

*Distribuzione in Italia*: Corsica.

*Località calabre*: Dintorni di Palizzi.

170. **Dictyna viridissima**, Wlk. 1837 (*Valckenaer - Ins. Apt.*, I, p. 631).

*Habitat*: Francia. Beerfelden. Dalmazia.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia, Liguria, Campania, Sicilia, Corsica, Capri.

*Località calabre*: Monte Poro. Alle *Pietre nigre* presso Palmi.

II.<sup>o</sup> Gen. **Titanoeca** Thor.

171. **Titanoeca albomaculata**, Luc. 1842 (sub: *Epeira*) - (*Lucas - Explor. de l'Algérie*, p. 250, tav. XV, fig. 6).  
*Habitat*: Europa australe. Regione mediterranea.  
*Distribuzione in Italia*: Trentino, Emilia, Nizza, Toscana, Sardegna, Corsica, Capraia.  
*Località calabre*: Arena e dintorni.

III.<sup>o</sup> Gen. **Amaurobius** C. K.

172. **Amaurobius fenestralis**, Stroem. 1768 (*Stroem - Beskr. ov. Norske ins. sec. Thorell*).  
*Habitat*: Europa.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto.  
*Località calabre*: Arena e dintorni.
173. **Amaurobius pallidus**, L. K. 1868 (*Koch L. - Arachn. Amacr. Coel. Cyb.*, p. 26).  
*Habitat*: Ungheria.  
*Distribuzione in Italia*: Ricontrato per la prima volta.  
*Località calabre*: Colle di Pizzo. Porto S.ta Venera, Mileto.
174. **Amaurobius similis**, Bl. 1859 (sub: *Cimiflo*) - (*Blackwall - Spid. of Gr. Brit.*, I, p. 141, tav. IX, fig. 89).  
*Habitat*: Inghilterra. Francia. Svizzera.  
*Distribuzione in Italia*: Ricontrato per la prima volta.  
*Località calabre*: Arena e dintorni.

XVII.<sup>a</sup> FAM. DRASSIDÆ.I.<sup>o</sup> Gen. **Prosthesima** L. K.

175. **Prosthesima femella**, L. K. 1866 (sub: *Melanophora*) - (*Koch L. - Drassiden*, IV, p. 76, fig. 114).  
*Habitat*: Europa meridionale.  
*Distribuzione in Italia*: Lombardia, Roma, Corsica.  
*Località calabre*: Monte Murello. Lungo la via in basso del colle di Pizzo.

176. **Prosthesima fuscipes**, L. K. 1866 (sub: *Melanophora*) - (*Koch L. - Drassiden*, IV, p. 189, fig. 127-129).  
*Habitat*: Spagna.  
*Distribuzione in Italia*: Sicilia, Corsica.  
*Località calabre*: Ruderi di Rocca Angiola. Arena e dintorni.
177. **Prosthesima Kochi**, Can. 1868 (sub: *Melanophora*) - (*Canestrini e Pavesi - Aram. Ital.*, p. 113).  
*Habitat*: Italia.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia.  
*Località calabre*: Dintorni di Palizzi.
178. **Prosthesima pedestris**, C. K. 1837 (sub: *Melanophora*) - (*Koch C. L. - Arachn.*, VI, p. 82, fig. 489).  
*Habitat*: Europa. Siria. Palestina.  
*Distribuzione in Italia*: Lombardia.  
*Località calabre*: Piani della Mella (Scilla).
179. **Prosthesima petrensis**, C. K. 1839 (sub: *Melanophora*) - (*Koch C. L. - Arachn.*, VI, p. 89, fig. 494, 495).  
*Habitat*: Europa.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Trentino.  
*Località calabre*: Monte Cavaliere (Aspromonte).
- II.<sup>o</sup> Gen. **Drassus** Wlk.
180. **Drassus lapidosus**, Wlk. 1802 (sub: *Aranea*) - (*Walckenaer - Faune Paris*, p. 222, n. 20).  
*Habitat*: Europa. Regione mediterranea. Cina. Kamsciataca. America settentrionale.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana, Campania, Sardegna, Corsica, Capraia.  
*Località calabre*: Ruderi di Rocca Angiola. Poco sotto i piani di Selanu (Bagaladi). Monte Cavaliere (Aspromonte).
181. **Drassus severus**, C. K. 1839 (*Koch C. L. - Arachn.*, VI, p. 22, fig. 446).

*Habitat*: Regione mediterranea.  
*Distribuzione in Italia*: Roma, Corsica.  
*Località calabre*: Colle di Pizzo. Marina di S. Ferdinando.

III.<sup>o</sup> Gen. **Pocillochroa** Westr.

182. **Pocillochroa conspicua**, L. K. 1866 (sub: *Macanophora*) - (Koch L. - *Drassiden*, III, p. 149, fig. 90-92).  
*Habitat*: Europa centrale e meridionale.  
*Distribuzione in Italia*: Ricontrato per la prima volta.  
*Località calabre*: Arena e dintorni.

IV.<sup>o</sup> Gen. **Gnaphosa** Latr.

183. \* **Gnaphosa basilicatae**, Sim. 1882 (*Simon - Aracn. del Vulture* ecc., p. 7).

*Habitat*:  
*Distribuzione in Italia*: { Cima del Doleidorme e del Pollino.  
*Località calabre*: }

184. **Gnaphosa bicolor**, H. 1831 (sub: *Drassus*) - *Hahn*  
*Arachn.*, I, p. 123, fig. 94).

*Habitat*: Europa.  
*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Emilia, Campania.  
*Località calabre*: Spiaggia dell'Angitola. Colle di Pizzo. Cassino Corso sul monte Poro. Cima di Montalto. Monte Cavaliere (Aspromonte).

185. **Gnaphosa lucifuga**, Wlk. 1802, (sub: *Drassus*) - (*Walckenaer - Tabl. des arach.*, p. 45, tav. V, fig. 46, 47).

*Habitat*: Europa.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia.  
*Località calabre*: Monte Cavaliere (Aspromonte).

186. **Gnaphosa montana**, L. K. 1866 (sub: *Pythomissa*) - Koch L. - *Drassiden*, I, p. 18, fig. 11).

*Habitat*: Baviera, Francia.

*Distribuzione in Italia*: Trentino.  
*Località calabre*: Monte Pietra Cappella (Aspromonte).

187. **Gnaphosa thressa**, Pavs. 1876 (*Præsi P. - Aracnidi turchi*, p. 18).

*Habitat*: Grecia. Turchia.

*Distribuzione in Italia*: Ricontrato per la prima volta.  
*Località calabre*: Un esemplare, non completamente sviluppato, raccolto in alto del monte Covolo, presso Palizzi.

V.<sup>o</sup> Gen. **Pythomissa** C. K.

188. **Pythomissa exornata**, C. K. 1839 (*Koch C. L. - Arachn.*, VI, p. 63, fig. 476, 477).

*Habitat*: Regione mediterranea e transalpina. Turchestan.  
*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Agro Romano, Campania, Puglia, Sardegna, Corsica, Ischia, Capri, Ustica.

*Località calabre*: Monte Murello. Colle di Pizzo. Monte Poro. Mileto. Monte Stella. Nicotera. Orti Versace e De-Leo a Baggnara. Castello di Scilla. Valletta della Melia. Casino Rossi a Bagaladi. Palizzi.

189. **Pythomissa nocturna**, L. 1758 (sub: *Aranea*) - (*Linnaeus - Syst. nat.*, ed. X, p. 2949, n. 21).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Abruzzo, Majella, Sicilia, Corsica.  
*Località calabre*: Monte Covolo, presso Palizzi.

VI.<sup>o</sup> Gen. **Clubiona** Latr.

190. **Clubiona corticalis**, Wlk. 1802 (sub: *Aranea*) - (*Walckenaer - Faune Paris*, II, p. 429).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Trentino, Monte Caria, Corsica.

*Località calabre*: Monte Poro.

191. **Clubiona frisca**, L. K. 1867 (*Koch L.* - *Drassiden*, VII, p. 319, fig. 205-207).

*Habitat*: Germania, Francia, Dalmazia.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Trentino.

*Località calabre*: Monte Cavaliere (Aspromonte).

192. **Clubiona pallidula**, Cl. 1757 (sub: *Araucus*) - (Clerck - *Opera citata*, p. 81, tav. II, fig. 7).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia.

*Località calabre*: Monte Cavaliere (Aspromonte).

193. **Clubiona terrestris**, Westr. 1851 (*Westring - Aran. Spec.*, p. 395).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Trentino, Corsica.

*Località calabre*: Presso il porto di Pizzo.

#### VII.<sup>o</sup> Gen. **Chiracanthium** C. K.

194. **Chiracanthium mildci**, L. K. 1864 (*Koch L.* - *Drassiden*, V, p. 253, fig. 161-163).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Campania, Sicilia, Corsica, Capri, Ischia.

*Località calabre*: Monte Murello. Colle di Pizzo. Monte Poro. Arena. Monte Stella. Castagneto ceduo e oliveti presso Palmi. Camposanto dei colerosi a Bagnara. Casino Rossi a Bagaladi. Monte Covolo. Palizzi. Monte Cavaliere.

195. **Chiracanthium nutrix**, Wlk. 1802 (sub: *Araucus*) - (*Walcenaer - Faune Paris*, p. 220).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Campania.

*Località calabre*: Colle di Pizzo. Porto S.ta Venera. Monte Poro. Nicotera. Monte Stella. Roccaforte. Palizzi. Monte Cavaliere.

196. **Chiracanthium pelagicum**, C. K. 1837 (sub: *Bolyphantes*) - (*Koch C. L.* - *Arachn.*, VI, p. 12, fig. 436, 437).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Lombardia, Campania, Sicilia, Corsica, Capri.

*Località calabre*: Colle di Pizzo. Palizzi.

197. **Chiracanthium siedlitzii**, L. K. 1866 (*Koch L.* - *Drassiden*, VI, p. 264, fig. 169-171).

*Habitat*: Europa meridionale. Regione transalpina.

*Distribuzione in Italia*: Roma, Campania, Sicilia, Sardegna, Corsica.

*Località calabre*: Catazaro. Ruderì di Rocca Angiola. Colle di Pizzo. Arena. Monte Cavaliere (Aspromonte). Palizzi.

#### VIII.<sup>o</sup> Gen. **Anyphaena** Sund.

198. **Anyphaena accentuata**, Wlk. 1802 (sub: *Araucus*) - (*Walcenaer - Faune Paris*, II, p. 226).

*Habitat*: Europa. Palestina.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Emilia, Sardegna, Corsica.

*Località calabre*: Arena e dintorni.

#### IX.<sup>o</sup> Gen. **Micariosoma** Sim.

199. **Micariosoma festivum**, C. K. 1835 (sub: *Micaria*) - (*Koch C. L.* - *Arachn.*, VI, p. 110, fig. 511, 512).

*Habitat*: Europa centrale e meridionale.

*Distribuzione in Italia*: Lombardia, Emilia, Toscana, Agro Romano.

*Località calabre*: Casino Rossi a Bagaladi.

200. **Micariosoma mauritense**, Luc. 1847 (sub: *Draconus*) - (*Lucas - Explor. de l'Algérie*, p. 222, tav. XIV, fig. 5).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Toscana, Roma.

*Località calabre*: Colle di Pizzo. Casino Rossi a Bagaladi.

X.º Gen. **Zora** C. K.

201. **Zora spinimana**, Sund. 1833 (sub: *Lycæna*) - (*Sundevall - Svenska spindl.*, p. 266, n. 1).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana, Corsica.

*Località calabre*: Marina S. Ferdinando. Valletta della Melia (Scilla).

XI.º Gen. **Zoropsis** Sim.

202. **Zoropsis ocreata**, C. K. 1841 (sub: *Dolomedes*) - (*Koch C. in M. Wagner Reiss. Abg.*, III, p. 212).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Veneto, Emilia, Liguria, Campania, Sicilia, Sardegna, Corsica, Capri.

*Località calabre*: Arena e dintorni.

III.º Sottord. **ARAN. GNAPHOSÆ**

## XVIII.ª FAM. SCYTODIDÆ.

I.º Gen. **Scytodes** Latr.

203. **Scytodes delicatula**, Sim. 1873 (*Simon - Aran. nov.*, II, p. 39).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Sicilia, Corsica.

*Località calabre*: Monte Murello, presso Rocca Angitola.

204. **Scytodes thoracica**, Latr. 1804 (sub: *Aranca*) - (*Latreille - Tabl. metod.*, XXIV, p. 134).

*Habitat*: Inghilterra. Olanda. Regione mediterranea. Africa equatoriale. Persia.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombar-

dia, Veneto, Emilia, Campania, Vulture, Sardegna, Corsica, Capri.

*Località calabre*: Spiaggia dell'Angitola. Arena. Monte Consolino. Casino De-Leo a Bagnara. Fra Bagnara e Scilla sotto un arco del viadotto. Casino Rossi a Bagaladi. Palizzi.

II.º Gen. **Loxosceles** Hein. et Lowe.

205. **Loxosceles erythrocephala**, C. K. 1839 (sub: *Scytodes*) - (*Koch C. L. - Arachn.*, V, p. 90, fig. 399, 400).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Campania, Sicilia, Sardegna, Corsica, Asinara, S. Antioce, Pianosa, Capri, Nisida, Lampedusa, Ustica.

*Località calabre*: Rovine di S.ta Venera.

## XIX.ª FAM. DYSDERIDÆ.

I.º Gen. **Dysdera** Latr.

206. **Dysdera erocota**, C. K. 1839 (*Koch C. L. - Arachn.*, V, p. 81, fig. 392-394).

*Habitat*: Europa. Africa settentrionale. S. Elena.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Emilia, Toscana, Agro Romano, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Elba, Topi, Montecristo, Pianosa, Vacca, Nisida, Capri, Pantelleria.

*Località calabre*: Ruèri di S.ta Venera. Arena. Foreste della Mongiana. Orto De-Bella in Nicotera. Orto Versace in Bagnara. Colle rimpetto al castello di Palizzi.

207. **Dysdera erythrina**, C. K. 1839 (*Koch C. L. - Arachn.*, V, p. 76, fig. 389).

*Habitat*: Europa.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana, Campania, Sicilia.

*Località calabre*: Orti di Mileto. Orto De-Bella a Nicotera.

Casino Gagliardi sul Monte Porò. Arena. Monte Pecoraro. Monasterace. Monte Cavaliere e monte Pietra Cappella (Aspromonte). Sella. Palizzi.

208. **Dysdera Pavessii**, Thor. 1873 (*Thorell - Rem. on Sym.*, p. 564).

*Habitat*: Italia.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Lombardia, Roma.

*Località catabre*: Un  $\frac{1}{2}$  fra le rovine di S.ta Venera.

#### II.<sup>o</sup> Gen. **Segestria** Latr.

209. **Segestria florentina**, Rossi 1790 (sub: *Araaea*) - (Rossi - *Fauna etrusca*, II, p. 133, tav. IX, fig. 3).

*Habitat*: Europa media. Regione mediterr. Is. S. Elena.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Canton Ticino, Lombardia, Trentino, Veneto, Istria, Emilia, Liguria, Toscana, Agro Romano, Campania, Sardegna, Montecristo, Capri, Ischia.

*Località catabre*: Pizzo. Arena. Foreste della Mongiana. Monte Cavaliere (Aspromonte).

#### III.<sup>o</sup> Gen. **Oonops** Templ.

210. **Oonops pulcher**, Templ. 1834 (*Templeton - On gen. Dysdera*, p. 404, tav. XVII, fig. 10).

*Habitat*: Inghilterra. Francia.

*Distribuzione in Italia*: Canton Ticino, Emilia.

*Località catabre*: Colle sopra Pizzo.

#### IV.<sup>o</sup> Sottord. ARAN. THERAPHOSÆ

##### XX.<sup>a</sup> FAM. FILISTATIDÆ.

###### Gen. **Filistata** Latr.

211. **Filistata testacea**, Latr. 1810 (*Latreille sec. Thorell*).  
*Habitat*: Europa. Regione mediterranea. Senegal. America. Oceania.

*Distribuzione in Italia*: Piemonte, Lombardia, Trentino, Emilia, Liguria, Toscana, Agro Romano, Campania, Sicilia, Sardegna, S. Antioco, Capri.

*Località catabre*: Spiaggia dell'Angitola. Pizzo. Rovine di S.ta Venera. Pianu di Selanu. Roccaforte. Palizzi.

##### XXI.<sup>a</sup> FAM. AVICULARIDÆ.

###### I.<sup>o</sup> Gen. **Nemesia** Aud. in Sav.

212. **Nemesia badia**, Auss. 1871 (*Ausserer A. - Beitr. z. Arachn. Fam. d. Tubitelariæ*, I, p. 169).

*Habitat*: Italia.

*Distribuzione in Italia*: Corsica.

*Località catabre*: A mezzacosta del monte Porò.

213. **Nemesia coemeteraria**, Latr. 1798 (*Latreille P. A. - Arag. mineuses*, II, p. 169, fig. 1, A-F).

*Habitat*: Regione mediterranea.

*Distribuzione in Italia*: Lombardia?, Veneto, Liguria, Sicilia, Sardegna, Corsica, Capri, Lampedusa.

*Località catabre*: Colle di Pizzo. Bagnaru. Imboccatura della grotta della Mella (Sella).

214. **Nemesia maculatipes**, Dol. 1852 (sub: *Cteniza*) - (*Dolleschall in Mss.*, p. 23, sec. *Ausserer*).

*Habitat*: Italia.

*Distribuzione in Italia*: Sardegna.

*Località catabre*: Arena e dintorni. Bosco sotto il monte Stella, presso Sילו.

II.º Gen. **Cyrtachenius** Thor.

215. **Cyrtachenius Doleschalli**, Auss. 1871 (*Aussere A. - Beitr. ut supra*, I, p. 46; II, tav. V, fig. 2).

*Habitat*: Italia, Tunisia.

*Distribuzione in Italia*: Sicilia.

*Località calabre*: Catanzaro.

## RIASSUNTO GENERALE

La fauna aracnologica è abbastanza riccamente rappresentata in Calabria, poichè, come appare dal mio catalogo e dal seguente specchio, quando si escluda la Fam. **Hersiliidae**, tutte le altre famiglie sono più o meno rappresentate.

Fam. Attidae	gen. 16	sp. 28
Lycosidae	4	23
Oxyopidae	1	2
Heteropodidae	2	3
Thomisidae	12	21
Palpimanidae	1	1
Eresidae	1	2
Epeiridae	10	34
Uloboridae	2	3
Theridionidae	19	30
Pholcidae	2	3
Hersiliidae	—	—
Uroctidae	2	3
Enyidae	1	1
Agelenidae	5	9
Dictynidae	3	11
Drassidae	11	28
Scytodidae	2	3
Dysderidae	3	5
Filistatidae	1	1
Avicularidae	2	4
Totale gen. 100		sp. 215

Oltre le specie nuove per la aracnologia in generale o per la arcano-fauna italiana, già pubblicate dal D.<sup>s</sup> G. Cavanna (1) e da E. Simon (2), l'esame degli esemplari, da me studiati, ci fa conoscere anzitutto una specie nuova per la aracnologia: *Monaes Leo* n. sp.

Le specie nuove per la fauna italiana sono 10, appartenenti a diverse famiglie:

Fam. Lycosidae	sp. <i>Perata hygrophilus</i> Thor.
"  "  "  "	<i>Fardosa torrentium</i> Sim.
Thomisidae	<i>Philodromus vagulus</i> Sim.
Theridiidae	<i>Dipoena leucoplagiata</i> Sim.
Uroctidae	<i>Oecobius cellariorum</i> Duges.
Dictynidae	<i>Dictyna globiceps</i> Sim.
"  "  "  "	<i>Amaurobius pallidus</i> C. K.
"  "  "  "	<i>Amaurobius similis</i> Bl.
Drassidae	<i>Poecilochroa conspicua</i> L. K.
"  "  "  "	<i>Guaphosa thressa</i> Pavs.

Più numerose sono le specie che finora solo si conoscevano come abitanti le nostre isole. Esse sono 19, così distribuite:

Fam. Attidae	sp. <i>Dendryphantas picaceus</i> Sim.
Thomisidae	<i>Xysticus parallelus</i> Sim.
"  "  "  "	<i>Tibellus macellus</i> Sim.
"  "  "  "	<i>Thanatus vulgaris</i> Sim.
Palpimanidae	<i>Palpimanus gibbulus</i> Duf.
Eresidae	<i>Eresus Walckenaevi</i> Br.
Epeiridae	<i>Peliosoma tuberculiferum</i> Sim.
"  "  "  "	<i>Tetragnata montana</i> Sim.
"  "  "  "	<i>Tetragnata nitens</i> Aud.
Pholcidae	<i>Spermophora elevata</i> Sim.
Uroctidae	<i>Uroctea Durandi</i> Wlk. (?)
"  "  "  "	<i>Oecobius annulipes</i> Luc.
Dictynidae	<i>Dictyna bicolor</i> Sim.
"  "  "  "	<i>Dictyna vicina</i> Sim.

(1) CAVANNA G. — Studi e ricerche di aracnologia in Bull. Soc. Entom. It., fasc. VIII, Firenze, 1870.

(2) SIMON E. — Aracnides recollés et Vulture. etc. Ibid. XIV, Firenze, 1889.


- Fam. *Drassidae* sp. *Prosthesima fuscipes* L. K.  
 „ *Scytodidae* „ *Scytodes delicatula* Sim.  
 „ *Arctularidae* „ *Nemesta badia* Auss.  
 „ *Nemesta maculata* Dol.  
 „ *Cyrtacanthus Doloschalli* Auss.

Quando la regione italiana sarà nelle sue provincie più accuratamente studiata, per ciò che riguarda i ragni, si potrà fare un confronto fra le diverse faunule e formare un catalogo generale: al presente questo studio potrebbe essere prematuro. Con maggiori studi, le aree di diffusione delle varie specie di ragni, piuttosto che venir localizzate, vengono allargate e ne è prova la *Lycosa tarantula* Rossi, che recentemente è stata trovata anche nella provincia di Pavia. Di molte specie poi si può predire la presenza in provincie, ove non ancora furono riscontrate, essendo state osservate in provincie circostanti e fra queste e quelle non esistendo ostacoli alla loro diffusione.

Bergamo, li 20 Novembre 1885.

Sac. Prof. ENRICO CAFFI

Medicario Apollonio — Dottore in Scienze Naturali



— 3 —

## INDICE

Introduzione . . . . .	Pag. 1
Conti bibliografici . . . . .	» 3
Catalogo sistematico. — Arctidae . . . . .	» 9
Lyosidae . . . . .	» 15
Oxyopidae . . . . .	» 20
Heteropodidae . . . . .	» 21
Thomisidae . . . . .	» 22
Palpimanidae . . . . .	» 28
Eresidae . . . . .	» ib.
Epeiridae . . . . .	» 29
Uloboridae . . . . .	» 37
Theridionidae . . . . .	» 38
Pholcidae . . . . .	» 44
Hersiliidae . . . . .	» 45
Urocheilidae . . . . .	» ib.
Euryidae . . . . .	» 46
Agelenidae . . . . .	» ib.
Dictynidae . . . . .	» 48
Drassidae . . . . .	» 50
Scytodidae . . . . .	» 56
Dysderidae . . . . .	» 57
Fillistidae . . . . .	» 59
Arctularidae . . . . .	» ib.
Riassunto generale . . . . .	» 60

— iii —

